

2026

Каталог насіння

КУКУРУДЗА ТА СОНЯШНИК

ЗАВЖДИ
ПОРУЧ
З ВАМИ



www.cropscience.bayer.ua



Зміст

Портфоліо соняшнику.....	6
Портфоліо кукурудзи.....	30
Боротьба з підробками.....	40
Рішення Acceleron® та Йоало®	106
Системи захисту	112
Climate FieldView™	116
Регіональна команда	122
Застереження та рекомендації	131

Уся інформація стосовно продуктів компанії ТОВ «Байер», що надається компанією або її співробітниками чи агентами в усній або письмовій формі, включно з інформацією, що міститься в цьому каталозі, надається сумлінно, проте вона не є гарантією компанії ТОВ «Байер» щодо результатів використання або придатності цих продуктів, адже ці результати можуть залежати від місцевих кліматичних умов та інших чинників. ТОВ «Байер» не несе відповідальності за жодну таку інформацію. Ця інформація не вказується в жодному контракті з компанією ТОВ «Байер», якщо інше не зазначено в письмовій формі.

ШАНОВНІ ФЕРМЕРИ!

Висловлюємо кожному з вас свою повагу та вдячність за плідну співпрацю з брендом DEKALB®!

Завдяки вашій стійкості сільське господарство продовжує розвиватися та підтримувати не тільки економіку України, але й глобальну стабільність у виробництві та забезпеченні продовольством населення Землі.

Ми віримо, що сільськогосподарський сезон 2026 року принесе врожаї високої якості зі стабільними цінами на с.-г. продукцію та стабільним функціонуванням логістичних шляхів для безперебійного постачання аграрної продукції до тих країн, які її потребують.



Будь-яка справа в рослинництві починається з якісного насіння, тож до сезону 2026 року ми підготували портфоліо гібридів кукурудзи та соняшнику, що містить уже відомі гібриди, які стабільно підтверджують свою продуктивність протягом свого існування на ринку. Також ми готові представити серію новинок, які формують ще кращі результати, оскільки прогрес у селекції із поєднанням господарсько-цінних характеристик, комплексу стійкості до біотичних й абіотичних факторів неодмінно зумовлює новий рівень продуктивності.

Хочемо зауважити, що оригінальне насіння бренду DEKALB® доступне тільки в оригінальних синіх мішках, додатково захищених системою перевірки Cap Seal. Компанія «Байєр» не замовляє перетруєння чи будь-яку іншу додаткову обробку насіння, що призводить до його перепакування. Саме на насіння в оригінальній упаковці, придбане в наших офіційних дистриб'юторів та протруєне інноваційною комбінацією Acceleron® Elite, поширюється гарантія виробника, технічна підтримка професійної команди «Байєр» та отримання очікуваного результату — високого врожаю відповідної якості.

На шляху реалізації місії «Байєр» — «Світ без хвороб і голоду» (Health for all, Hunger for none) ми прагнемо співпрацювати з вами якнайтісніше, аби разом змінювати на краще майбутнє сільського господарства у світі та Україні зокрема.

Щиро бажаємо вам успішного сезону, високих урожаїв та задоволення від результатів!

Лаерсіо Бортоліні, керівник Аграрного підрозділу
Польщі, Чехії/Словаччини, Балтійських країн та України

Анна Громаковська, керівник Аграрного підрозділу
з операційних питань в Україні

ЗАВЖДИ ПОРУЧ З ВАМИ!

*Поки ви розпочинаєте новий сезон,
ми створюємо майбутні перспективи*

*Ми вкладаємо значні ресурси в постійне
вдосконалення якості нашої продукції та
розробку нових рішень. Такий підхід дає нам
зможу забезпечувати максимально прибутковий
і стійкий спосіб ведення сільського господарства.*



Понад
260 млн €
інвестицій
у будівництво
заводу



Демонстраційні
дослідження
5
Байєр АгроАрен



Понад
700
працівників



Експорт насіння
в країни
ЄС

ПОРТФОЛІО ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ





Зміст

Стадії розвитку соняшнику	8
Загальні відомості	10
Суппортер СУ НОВИНКА	12
Базалът НОВИНКА	14
Мегаполіс КЛП НОВИНКА	16
Вівальто НОВИНКА	18
Гудзон	20
Бельведер	22
Еленіс	24
1018 Л КЛП	26
Людмила	28



СТАДІЇ РОЗВИТКУ СОНЯШНИКУ



СІВБА	VE	V1-VN	R1	R3
Проростання Насіння поглинає вологу (від 97 до 240% від маси залежно від гібрида), набубнявіє, з'являється корінець, з'являється гіпокотиль із сім'ядолями	Поява сходів Сім'ядолі з'являються на поверхні. Перші справжні листки менше 4 см у довжину	Розвиток листків Підраховують лише ті листки, які більше 4 см у довжину. Кількість листків є сортовою ознакою й може коливатися від 23 до 36	Стадія «зірочки» На поверхні пагону утворюється квітковий бутон розміром з монету 5 коп., який нагадує зірочку з променями. Починається стрімкий ріст стебла в довжину	Квітковий бутон Незрілий бутон витягується більше 2 см над найближчим листям. Продовжується ріст стебла та листків

КОД ВВСН

00-08	09	12-39	51	52-58
-------	----	-------	----	-------

ДНІ ПІСЛЯ СІВБИ

0	10		48	67
---	----	--	----	----



R4	R5.1–5.5	R5.9	R6–R7	R8–R9
Початок розкриття кошика По периметру суцвіття добре помітні язичкові квітки, які мають жовте забарвлення	Початок — середина цвітіння Залежно від відсотка розкритих трубчастих квіток розподіляється на проміжні стадії: R5.1 — 10% R5.3 — 30% R5.5 — 50% Завершується ріст стебла	Кінець цвітіння Добігає кінця процес запліднення квіток. Завершується формування листків. Рослина починає поглинати багато води	Утворення та розвиток насіння Язичкові квітки осипаються. Розпочинаються процеси утворення, наливу насіння та процеси синтезу олії. Найбільш критичний період формування врожаю та його якості	Фізіологічна і технічна стиглість Кошик набуває жовтого, а потім коричневого забарвлення. Налив насіння припиняється. Іде втрата вологи. Вологість насіння знижується із 40 до 10–12%
КОД ВВСН				
59	60–65	69	71–79	81–89
ДНІ ПІСЛЯ СІВБИ				
71	73–77	83	84–86	104–119

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Формула врожайності

Урожай — це результат поєднання цілої низки важливих компонентів, як-от стан ґрунту, генетичний потенціал насіння, волога, живлення, погодні умови, захист у період вегетації, рістрегуляція та інше. Але скільки б їх не було, усі вони впливають усього на дві складові — це кількість зерна та його якість (виповненість, вага, олійність, білок, цукор тощо).

Кількість насінин

Для соняшнику цей показник напряму залежить від кількості рослин (кошиків) на гектарі й формується в період від сівби до стадії V2 та багато в чому залежить від якості сівби і захисту сходів. Кількість насіння на одній рослині визначатиметься кількістю закладених у кошику квіток. Кількість зачатків квіток визначається на стадіях V6–R1. Однак не всі зачатки будуть фертильними, тобто здатними запилитися й сформувати повноцінне насіння. Як правило, рослина «перестраховується» і закладає більшу кількість квіток, ніж надалі може забезпечити.

З кількістю фертильних квіток рослина визначається пізніше, на стадіях R1–R4. Тут вирішальне значення матиме достатнє надходження в рослину необхідних елементів


живлення, а також інтенсивність фотосинтезу. Соняшник — культура перехресного запилення, і для запилення максимальної кількості квіток необхідне дотримання двох умов: наявність достатньої кількості запилювачів та прийнятна погода (сонце, слабкий вітер і незначні опади). Якщо ці умови не виконуються, то не всім фертильним квіткам судилося стати насінням.

Маса тисячі насінин


Друга важлива складова врожаю — маса насіння. Формується вона після цвітіння — стадії R6–R8. Тут визначальним фактором буде достатня кількість фосфору та калію, які рослина отримує як із ґрунту, так і завдяки реутилізації з інших частин рослини. Власне, для вільного руху елементів рослиною потрібен достатній рівень забезпечення рослини водою. Приблизно в цей же час відбувається формування якості врожаю — вміст олії в насінні.

Таким чином, вегетаційний період соняшнику можна умовно розбити на два етапи: перший — це формування врожаю, який триває від сівби до цвітіння, другий — етап збереження врожаю від цвітіння до закінчення наливу насіння. Найкритичнішим на етапі формування врожаю соняшнику є період R1–R4, оскільки саме в цей час визначається кількість фертильних

Етапи формування та збереження врожаю



Склад різновидів продовольчого жиру та олії



квіток або потенційна кількість насіння. На етапі збереження врожаю найважливішою є фаза R6–R8. Саме в цей період відбувається утворення мезофілу сім'ядоль — тканини, що запасає жирні кислоти, тобто фактично формується рівень олійності насіння. Нестача вологи та інші негативні фактори пригнічують ріст і розвиток насіння всіх зон кошика.

Забезпечення оптимальних умов у ключові фази розвитку дасть змогу рослині використати весь закладений у неї потенціал та сформувати справді високий і якісний урожай.

Олія

З давніх часів соняшник зачаровував людей своєю красою, тому й вирощували його спочатку як квітку, потім як лікарську рослину, згодом олію соняшнику почали використовувати в технічних цілях. І тільки починаючи з XIX сторіччя соняшникова олія стала займати своє почесне місце на кухонних полицях у різних країнах по всьому світу.

Наразі надзвичайну популярність набирає здорове харчування, і тому рослинні олії знову потрапляють у фокус уваги людства.

Порівняння характеристик найпопулярніших рослинних олій вказує на винятковий склад соняшникової олії, яка є лідером за вмістом корисних ненасичених кислот.

За даними FEDIOL (європейської асоціації виробників рослинної олії та протеїнового борошна), соняшникова олія містить близько 89% ненасичених кислот, корисних для споживання людиною. За цим показником вона поступається лише одній — ріпаковій.

Дедалі більшу популярність набирають гібриди соняшнику з високим вмістом олеїнових кислот, так звані високоолеїнові гібриди. Загальний вміст ненасичених кислот в олії таких гібридів доходить до 95%, це безсумнівно підіймає популярність соняшникової олії та підвищує її попит на світовому ринку. Разом із покращенням якісних показників олії не припиняється селекційна робота над пошуками гібридів із підвищеною загальною часткою олії. Ще кілька десятиріччя тому досить високим рівнем олійності була частка в 40%, на сьогодні цей показник у деяких гібридів перевищує 50%, а це означає, що за тієї самої врожайності вихід олії підвищився приблизно на чверть.

Однією з переваг гібридів соняшнику від компанії «Байєр» є саме висока олійність. За середнього рівня закупівельного базису в 46%, більш високий відсоток олійності буде відчутно підвищувати загальну прибутковість гібрида.

НОВИНКА

СУППОРТЕР СУ

Високоврожайний лінолевий гібрид
під технологію ExpressSun®Тип гібрида: **інтенсивного типу**Група стиглості: **пізньостиглий, 116–120 днів**

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Альтернاریоз

6 7 8 **9**Біла гниль
прикоренева6 7 **8** 9

Вугільна гниль

6 7 **8** 9

Іржа

6 7 8 **9**Несправжня
борошниста роса6 **7** 8 9

Фомопсис

6 **7** 8 9

АГРОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Стартовий розвиток

6 7 **8** 9

Стійкість до вилягання

6 **7** 8 9

Запилення

6 7 8 **9**

Вміст олії

6 7 **8** 9

Посуhostійкість

6 7 **8** 9

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Високий потенціал урожайності в умовах вирощування за інтенсивною технологією
- Висока стійкість до посушливих умов

ЗАГАЛЬНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИСтійкість до вовчка: **раси А–G**Вміст олії: **на рівні 46–50%**Висота рослини: **вище за середню**Нахил кошика: **напівнахилений**Маса тисячі насінин: **52–60 грамів**Потенціал урожайності: **50 ц/га**

Добра стійкість до посухи

ГУСТОТА НА ЧАС
ЗБИРАННЯ

Посушливі умови:


55 000–60 000 шт./га

Умови достатнього

зволоження:

60 000–65 000 шт./гаСкануйте QR-код.
Більше про
наш гібрид тут

АНАЛІЗ УРОЖАЙНОСТІ СУППОРТЕР ПОРІВНЯНО З ІНШИМИ СУЛЬФОГІБРИДАМИ. УКРАЇНА, 2024 р.



Путренков Сергій,

менеджер з маркетингу, компанія «Байєр»



Новинка в сегменті сульфогібридів від компанії «Байєр» — гібрид під назвою Суппортер. Пізньостиглий, високоврожайний гібрид, інтенсивного типу. Посіви цього гібрида вирівняні, кошик напівнахилений, що позитивно впливає на стійкість до хвороб кошика. Має генетичну стійкість до семи рас вовчка. Характеризується високою посухостійкістю, якісним запиленням та високим рівнем стабільності щодо показників урожайності. Найвищий рівень толерантності має до листових хвороб (це альтернаріоз та іржа), високий рівень відповідно до вугільної гнилі та білої гнилі (прикоренева форма). Гібрид універсальний, придатний для вирощування на всіх типах ґрунтів і в усіх кліматичних зонах. Головними перевагами є висока врожайність та олійність.

НОВИНКА

БАЗАЛЛЪТ

Високоврожайний лінолевий гібрид
під класичну технологію

Тип гібрида: **лінолевий**Група стиглості: **середньостиглий, 110–116 днів**

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Біла гниль кошика

6 7 8 9

Біла гниль
прикоренева

6 7 8 9

Вертицильоз

6 7 8 9

Іржа

6 7 8 9

Несправжня
борошниста роса

6 7 8 9

Фомоз

6 7 8 9

Фомопсис

6 7 8 9

АГРОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Стартовий розвиток

6 7 8 9

Стійкість до вилягання

6 7 8 9

Запилення

6 7 8 9

Вміст олії

6 7 8 9

Посуhostійкість

6 7 8 9

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Пластичний гібрид із високим рівнем олійності
- Компактний, зручний для збирання
- Стійкий до вилягання
- Нова генетика з високою стійкістю до несправжньої борошнистої роси

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стійкість до вовчка: **раси А–F**Вміст олії: **на рівні 46–52%**Висота рослини: **середня**Нахил кошика: **напівнахилений**Маса тисячі насінин: **52–70 грамів**Потенціал урожайності: **50 ц/га**

Посуhostійкість

Якість запилення

ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ

Посушливі умови:

55 000–60 000 шт./га


Умови достатнього

зволоження:

55 000–60 000 шт./га

Скануйте QR-код.
Більше про
наш гібрид тут

АНАЛІЗ УРОЖАЙНОСТІ БАЗАЛЛЪТ ПОРІВНЯНО З ІНШИМИ КЛАСИЧНИМИ ГІБРИДАМИ. УКРАЇНА, 2023–2024 рр.



Мунтян Іван,
менеджер з технологій вирощування с.-г. культур, компанія «Байєр»

Новинка в сегменті класичних гібридів від компанії «Байєр», гібрид під назвою Базальт. Пластичний, середньостиглий гібрид із високим рівнем олійності. Висота рослин нижча за середню, кошик напівнахилений. Має генетичну стійкість до шести рас вовчка. Характеризується високою посухостійкістю, якісним запиленням, стійкістю до вилягання та високим рівнем стабільності щодо показників урожайності. Найвищий рівень толерантності має до таких хвороб, як фомопсис, біла гниль (прикоренева форма) та несправжня борошниста роса, що дає змогу сіяти цей гібрид у ранні строки. Гібрид універсальний, придатний для вирощування на всіх типах ґрунтів і в усіх кліматичних зонах. Головними перевагами є високі врожайність та олійність.

НОВИНКА

МЕГАПОЛІС КЛП

Високоврожайний лінолевий
гібрид під технологію Clearfield® PlusТип гібрида: **інтенсивний тип**
Група стиглості: **середньоранній, 106–110 днів**

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Альтернاریоз

6 7 **8** 9Біла гниль
прикоренева6 7 **8** 9

Вертицильоз

6 **7** 8 9

Вугільна гниль

6 7 8 **9**

Іржа

6 **7** 8 9Несправжня
борошнеста роса6 7 8 **9**

Фомопсис

6 7 **8** 9

АГРОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Стартовий розвиток

6 7 **8** 9

Стійкість до вилягання

6 **7** 8 9

Запилення

6 7 8 **9**

Вміст олії

6 7 **8** 9

Посухостійкість

6 7 **8** 9

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Швидкий старт та ранній розвиток
- Високий потенціал урожайності в поєднанні з ранньою стиглістю
- Нова генетика з високою стійкістю до несправжньої борошнистої роси

ЗАГАЛЬНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИСтійкість до вовчка: **раси А–G**Вміст олії: **на рівні 48–52%**Висота рослини: **вище за середню**Маса тисячі насінин: **52–60 грамів**Потенціал урожайності: **50 ц/га**

Досить гарна стійкість до посухи

Вирівняність рослин

ГУСТОТА НА ЧАС
ЗБИРАННЯ

Посушливі умови:


55 000–60 000 шт./га

Умови достатнього

зволоження:

60 000–65 000 шт./гаСкануйте QR-код.
Більше про
наш гібрид тут

АНАЛІЗ УРОЖАЙНОСТІ МЕГАПОЛІС ПОРІВНЯНО З ІНШИМИ КЛП ГІБРИДАМИ. УКРАЇНА, 2023–2024 рр.



Чепур Анатолій,
менеджер з технологій вирощування с.-г. культур, компанія «Байєр»



Мегapolis — високоврожайний гібрид під технологію гербіцидного захисту Clearfield® Plus. Середньоранній, лінолевий гібрид, інтенсивного типу. Має генетичну стійкість до вовчка раси G (сьома раса). Virізняється найвищим рівнем стійкості до несправжньої борошнистої роси. Посіви цього гібрида вирівняні. Якщо для вас важливі швидкий старт і ранній розвиток посівів, тоді цей гібрид справді вартий уваги. Високий рівень толерантності має до таких хвороб, як альтернаріоз, фомопсис, вугільна гниль та біла гниль (прикоренева форма). Гібрид універсальний, придатний для вирощування на всіх типах ґрунтів і в усіх кліматичних зонах. Найкраще свій потенціал зможе розкрити в умовах Північної, Центральної та Південної України. Головними перевагами є висока врожайність та високий рівень толерантності до хвороб.

НОВИНКА

ВІВАЛЛЬТО

Високоврожайний лінолевий гібрид
під технологію Clearfield® PlusТип гібрида: **інтенсивного типу**Група стиглості: **ранньостиглий, 100–105 днів**

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Біла гниль кошика

6

7

8

9

Вертицильоз

6

7

8

9

Іржа

6

7

8

9

Несправжня
борошниста роса

6

7

8

9

Фомоз

6

7

8

9

Фомопсис

6

7

8

9

АГРОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Стартовий розвиток

6

7

8

9

Стійкість до вилягання

6

7

8

9

Запилення

6

7

8

9

Вміст олії

6

7

8

9

Посуhostійкість

6

7

8

9

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Пластичний гібрид із високим рівнем олійності
- Компактний, зручний для збирання
- Стійкий до вилягання
- Нова генетика з високою стійкістю до несправжньої борошнистої роси RM9+

ЗАГАЛЬНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИСтійкість до вовчка: **раси А–G**Вміст олії: **на рівні 48–52%**

Раннє цвітіння та дозрівання

Висота рослин: **нижча за середню**Положення кошика: **нахилений**Потенціал урожайності: **50 ц/га**

Висока стресостійкість

Висока якість запилення

ГУСТОТА НА ЧАС
ЗБИРАННЯ

Посушливі умови:

55 000–60 000 шт./га


Умови достатнього

зволоження:

60 000–65 000 шт./га

Скануйте QR-код.
Більше про
наш гібрид тут

АНАЛІЗ УРОЖАЙНОСТІ ВІВАЛЛЬТО ПОРІВНЯНО З ІНШИМИ ГІБРИДАМИ. УКРАЇНА, 2023–2024 рр.



Любар Віктор,
експерт з технологічного супроводу насіннєвого бізнесу, компанія «Байєр»



Вівалльто — високоврожайний гібрид під технологію гербіцидного захисту Clearfield® Plus. Ранньостиглий лінолевий гібрид, має генетичну стійкість до вовчка раси G (сьома раса). Гібрид компактний, добре запилюється, з висотою рослин нижче середньої, що позитивно впливає на стійкість до вилягання та на зручність збирання. Virізняється найвищим рівнем стійкості до несправжньої борошністої роси та високою стійкістю до стресових умов (критичні температури, посуха), що дає змогу сіяти цей гібрид у ранні строки. Гібрид універсальний, придатний для вирощування в усіх кліматичних зонах. Вівалльто — це можливість ранніх термінів сіви, високий ступінь збереженості рослин та високі врожайність і олійність.



ГУДЗОН

Високоврожайний гібрид
під технологію ExpressSun®

Тип гібрида: **лінолевий**
Група стиглості: **ранньостигла, 100–105 днів**

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Альтернاریоз	6	7	8	9
Біла гниль кошика	6	7	8	9
Біла гниль прикоренева	6	7	8	9
Вертицильоз	6	7	8	9
Вугільна гниль	6	7	8	9
Іржа	6	7	8	9
Несправжня борошниста роса	6	7	8	9
Фомопсис	6	7	8	9

АГРОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Стартовий розвиток	6	7	8	9
Стійкість до вилягання	6	7	8	9
Запилення	6	7	8	9
Вміст олії	6	7	8	9
Посуhostійкість	6	7	8	9

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Висока стійкість до посушливих умов
- Високий рівень толерантності до хвороб
- Висока стійкість до несправжньої борошнистої роси на рівні PL9

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стійкість до вовчка: **раси A-F+**
Вміст олії: **на рівні 48–50%**
Висота рослини: **висока**
Нахил кошика: **нахилений**
Маса тисячі насінин: **52–60 грамів**

ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ


Посушливі умови:
55 000–60 000 шт./га

Умови достатнього зволоження:
60 000–65 000 шт./га



Скануйте QR-код.
Більше про
наш гібрид тут

Результати урожайності Гудзон



■ Показники сезону 2024 р.

Дані з демопосівів.



Чубук Олександр Іванович,
директор, СФГ «ЧАЙКА-2», Київська обл., Броварський р-н

Гібрид соняшнику Гудзон сів уперше та порівнював із гібридом-конкурентом, який вирощував багато років поспіль. Власне, приємно здивований результатом. За нульової технології отримав 3 т із вологістю 6%. Гібрид-конкурент продемонстрував урожайність трохи нижчу — на рівні 2,6 т. Мене вразив розвиток і загальний стан Гудзона, а також його висока олійність, швидкі темпи росту і розвитку.



БЕЛЬВЕДЕР

Високоврожайний гібрид
під класичну технологію

Тип гібрида: **лінолевий**
Група стиглості: **середньорання, 106–110 днів**

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Біла гниль кошика	6	7	8	9
Біла гниль прикоренева	6	7	8	9
Вертицильоз	6	7	8	9
Іржа	6	7	8	9
Несправжня борошниста роса	6	7	8	9
Фомоз	6	7	8	9
Фомопсис	6	7	8	9

АГРОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Стартовий розвиток	6	7	8	9
Стійкість до вилягання	6	7	8	9
Запилення	6	7	8	9
Вміст олії	6	7	8	9
Посуhostійкість	6	7	8	9

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Високий потенціал урожайності
- Високий вміст олії
- Вдала комбінація стійкості до хвороб та посух

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стійкість до вовчка: **раси А–G**
Вміст олії: **на рівні 48–52%**
Висота рослини: **середня**
Нахил кошика: **нахилений**
Маса тисячі насінин: **57–65 грамів**

ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ

Посушливі умови:
40 000–50 000 шт./га


Умови помірного зволоження:
55 000–60 000 шт./га

Умови достатнього зволоження:
60 000–65 000 шт./га



Скануйте QR-код.
Більше про
наш гібрид тут

Результати урожайності Бельведер



- Показники сезону 2024 р.
- Показники сезону 2023 р.
- Показники сезону 2022 р.

Вологість під час збирання, %.

Дані з демопосівів.



Морозов Віталій Степанович,
головний агроном, ТОВ «Україна», Тернопільська обл., Підволочиський р-н

Соняшник Бельведер ми вирощуємо вже третій сезон. З кожним сезоном площі під ним тільки збільшуються. Цього року в нас 1800 га соняшнику, приблизно 45% із них — це посіви Бельведер. За показники стійкості до хвороб можемо поставити найвищу оцінку. Перед збиранням приблизно 40% рослин ще мали зелені листки, хоча вологість зерна показувала, що він готовий до збирання. Отже, на 3 жовтня вже зібрано два поля, наразі врожайність сягає приблизно 4,3–4,4 т/га. Щодо олійності скажу так: це один із плюсів Бельведера, він показує плюс 1–2% олійності, порівняно з іншими гібридами, що додає йому конкуренції на ринку. Наступного сезону також плануємо 45–50% площ засіяти Бельведером.



ЕЛЕНІС

Стресостійкий гібрид Clearfield® Plus
без обмежень щодо кліматичних зон

Тип гібрида: **лінолевий**
Група стиглості: **середньорання, 105–110 днів**

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Альтернатіоз	6	7	8	9
Біла гниль кошика	6	7	8	9
Біла гниль прикоренева	6	7	8	9
Вертицильоз	6	7	8	9
Вугільна гниль	6	7	8	9
Іржа	6	7	8	9
Несправжня борошниста роса	6	7	8	9

АГРОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Стартовий розвиток	6	7	8	9
Стійкість до вилягання	6	7	8	9
Запилення	6	7	8	9
Вміст олії	6	7	8	9
Посуhostійкість	6	7	8	9

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Високий потенціал урожайності за вирощування за інтенсивною технологією
- Високий рівень толерантності до хвороб
- Немає фітотоксичності після обробки гербіцидом — немає затримки розвитку

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стійкість до вовчка: **раси А–F**
Вміст олії: **на рівні 47–49%**
Висота рослин: **середня**
Кошик: **напівнахилений**
Маса тисячі насінин: **52–60 грамів**

ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ


Посушливі умови:
55 000–60 000 шт./га

Умови достатнього зволоження:
60 000–65 000 шт./га



Скануйте QR-код.
Більше про
наш гібрид тут

Результати урожайності Еленіс



- Показники сезону 2024 р.
- Показники сезону 2023 р.


Вологість під час збирання, %.

Дані з демопосівів.



Симоненко Андрій Павлович,
головний агроном, ГК «Лан», Черкаська обл, Черкаський р-н

У господарстві посіяно 700 га гібрида ДК Еленіс. Під час вибору гібридів бралися до уваги дані з демоділянок і товарних посівів більш ніж із 200 гібридів. Упродовж вегетації гібрид ріс рівномірно та мав повноцінне запилення. За середньої врожайності по господарству в цьому сезоні 29 ц/га, Еленіс показує 31 ц/га, але збиральна кампанія триває, і ми очікуємо ще вищий показник по цьому гібридові. Гібридом Еленіс задоволені та плануємо сіяти його і в наступному сезоні.



1018 Л КЛП

Стресостійкий гібрид Clearfield® Plus
без обмежень щодо кліматичних зон

Тип гібрида: **лінолевий**

Група стиглості: **середньорання, 110–115 днів**

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Альтернاریоз	6	7	8	9
Біла гниль кошика	6	7	8	9
Біла гниль прикоренева	6	7	8	9
Вертицильоз	6	7	8	9
Вугільна гниль	6	7	8	9
Іржа	6	7	8	9
Несправжня борошниста роса	6	7	8	9
Фомоз та фомопсис	6	7	8	9

АГРОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Стартовий розвиток	6	7	8	9
Стійкість до вилягання	6	7	8	9
Запилення	6	7	8	9
Вміст олії	6	7	8	9
Посуhostійкість	6	7	8	9

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Високий потенціал урожайності
- Висока стійкість до посушливих умов
- Нова генетика з високою стійкістю до несправжньої борошнистої роси (PL9)

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стійкість до вовчка: **раси А–G**
Вміст олії: **на рівні 46–50%**
Висота рослини: **середня**
Нахил кошика: **нахилений**
Маса тисячі насінин: **52–60 грамів**

ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ


Посушливі умови:
55 000–60 000 шт./га

Умови достатнього зволоження:
60 000–65 000 шт./га



Скануйте QR-код.
Більше про
наш гібрид тут

Результати урожайності 1018 Л КЛП



■ Показники сезону 2024 р.

Дані з демопосівів.

Ханко Максим,
головний агроном, ДП «Глобинеагропродукт»,
Полтавська обл., Кременчуцький р-н



За рекомендаціями менеджера компанії «Байер» взяли спробувати новинку 1018-Л КЛП у своє господарство. Так склалися кліматичні умови, що дощ у нашому районі не було 43 дні й була жорстока посуха. Ми вже звикли до врожайності на рівні 2 т/га, максимум — 2,5 т/га, але цей гібрид здивував, і поле 50 га ми закрили з урожайністю 2,97 т/га. Була проблема в нашому господарстві в інших гібридах із несправжньою борошністою росю, але на цьому гібридові її взагалі не було, тому ми і вийшли на такі показники. Тож цей гібрид займе гідне місце в нашому господарстві.



ЛЮДМИЛА

Високоврожайний гібрид
під класичну технологію

Тип гібрида: **лінолевий**

Група стиглості: **середньорання, 110–115 днів**

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Альтернاریоз	6	7	8	9
Біла гниль кошика	6	7	8	9
Біла гниль прикоренева	6	7	8	9
Вертицильоз	6	7	8	9
Вугільна гниль	6	7	8	9
Несправжня борошниста роса	6	7	8	9
Іржа та фомоз	6	7	8	9
Фомопсис	6	7	8	9

АГРОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Стартовий розвиток	6	7	8	9
Стійкість до вилягання	6	7	8	9
Запилення	6	7	8	9
Вміст олії	6	7	8	9
Посуhostійкість	6	7	8	9

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Високий потенціал урожайності за умов вирощування за інтенсивною технологією
- Висока стійкість до посушливих умов
- Покращений рівень толерантності до фомозу, фомопсису, альтернاریозу та вугільної гнилі

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стійкість до вовчка: **раси А–G**
Вміст олії: **на рівні 48–53%**
Висота рослини: **середня**
Нахил кошика: **напівнахилений**
Маса тисячі насінин: **52–60 грамів**

ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ


Посушливі умови:
55 000–60 000 шт./га

Умови достатнього зволоження:
60 000–65 000 шт./га



Скануйте QR-код.
Більше про
наш гібрид тут

Результати урожайності Людмила



■ Показники сезону 2024 р.

Дані з демопосівів.

Нечипоренко Максим Петрович,
головний агроном, СТОВ АФ «Маяк»,
Черкаська обл., Золотоніський р-н



У сезоні 2025 за рекомендацією представника компанії «Байер» вирішили спробувати в товарному посіві гібрид-новинку від DEKALB® — соняшник Людмила. Результатом більше ніж задоволенні. Урожайність «на коло» отримали 35,8 ц/га із площі 100 га. До слова, це найбільше серед 6 гібридів соняшнику, які ми висівали в господарстві.