

КАТАЛОГ

НАСІННЯ ПОЛЬОВИХ КУЛЬТУР
КОМПАНІЇ «ЛІМАГРЕЙН»



2024





ЖИТТЯ ШИКА
СОНЯШНИКА

ТУНКА

ЛГ5555 КЛП

ЛГ50541 КЛП

ЛГ50501 КЛП

ЛГ50529 СХ

ЛГ5542 КЛ

ЛГ5377

ЛГ50500

ЛГ50510

ЛГ5478

ЛГ50450

ЛГ50455 КЛП

ЛГ50635 КЛП

ЛГ50479 СХ

ЛГ59580

ЛГ5463 КЛ



40 РОКІВ СЕЛЕКЦІЇ СОНЯШНИКА



ТОВ «Лімагрейн Україна», вул. Тургенєвська, 55, 04050,
Київ. тел./факс: +380 44 484 67 76

Limagrain 
2024

40 РОКІВ ГЕНЕТИЧНОГО ПРОГРЕСУ ТА ІННОВАЦІЙ СОНЯШНИКУ

Сорок років тому, маючи на увазі майбутні зміни на ринку олії йної та переваги соняшнику, керівництво Limagrain вирішило запустити програму селекції цієї культури.

З 1983 року Limagrain працює над впровадженням інновацій щодо олійного соняшнику, покращуючи агрономічні та економічні показники для збільшення прибутку фермерів. Сьогодні соняшник став економічно вигідною культурою, яка відіграє важливу роль у сівозміні. Його посухостійкість є перевагою в контексті зміни клімату. За підтримки однієї з наймасштабніших дослідницьких програм соняшнику наші відділи продажів і маркетингу на основних ринках Європи розробляють **продукти для кожного сегмента лінолевої та олійної кислот**, від гібридів під класичну технологію до гібридів стійких до гербіцидів.

Будучи № 3 виробником насіння соняшнику в Європі, Limagrain Europe продовжує інвестувати в розробку інноваційних рішень для фермерів.

ПОСТІЙНИЙ ПОТІК ІННОВАЦІЙ:

Протягом 40 років Limagrain Europe пропонує безперервний розвиток інновацій на ринку соняшника. На додаток до підвищення врожайності, вмісту олії, адаптованої ранньостиглості та стійкості до хвороб, Limagrain Europe зосереджується насамперед на продуктивності своїх гібридів шляхом покращення їх стійкості до посухи та вовчка. З 2005 року компанія Limagrain Europe також виводить гібриди з високим вмістом олійної кислоти для різних регіонів та позиціонує себе серед лідерів у Франції (найбільшому ринку олійного соняшника за останні 10 років.) Комбінація ключових властивостей соняшнику була дуже швидко поєднана з технологіями Clearfield (r) і Express(r), допомагаючи боротися з бур'янами які важко контролювати. Технології Clearfield і Clearfield Plus були швидко інтегровані

в інноваційну технологію SUNEО для боротьби з агресивними расами вовчка.

SUNEО
Технологія захисту врожайності

10 РОКІВ ЕФЕКТИВНОЇ БОРОТЬБИ З ВОВЧКОМ ТА ПОКАЗНИКАМИ ВРОЖАЙНОСТІ


У 2013 році LG впровадила ще одну інновацію, запропонувавши гібриди під брендом технології SUNEО, яка поєднує потенціал врожайності та ефективно бореться з вовчком за допомогою генетики та технології Clearfield або Clearfield Plus. Таким чином, виробники максимізують потенціал своїх полів шляхом боротьби з бур'янами та вовчком. За десять років посівні площі під соняшником технології SUNEО зросли в десять разів. Боротьба з вовчком соняшниковим (Orobanche Cuscuta), яка може призвести до значної втрати врожаю, є основною метою селекції. Крім того, команди селекціонерів Limagrain Europe дуже уважно стежать за

еволюцією нових рас даного паразита, пропонуючи фермерам найкраще адаптований продукт. Випуск перших гібридів OR-X у 2018 році, які поєднували в собі гени з множинною толерантністю до рас вовчка > G, доповнив лінійку класичних гібридів та соняшника під технологію SUNEО для боротьби з вовчком



ГЕНЕТИЧНИЙ ЗАХИСТ ВІД НЕСПРАВЖНОЇ БОРОШНИСТОЇ РОСИ

З 2020 року LG розробила гібриди стійкі до несправжньої борошністої роси (НБР), які не потребують спеціальної додаткової обробки насіння проти цієї хвороби. Завдяки поєднанню специфічних генів і множинної стійкості селекціонерам вдалось вивести продукти, які є ефективними проти НБР. Таким чином, фермери з самого початку забезпечують розкриття максимального потенціалу урожайності своїх соняшників.



ЛГ5377



Середня висота
рослини, см

155



Середній діаметр
кошика, см

15,9



Середня маса
1000 зерен, г

70

Під класичну технологію

**ВИСОКОПЕНТЕНЦІЙНИЙ
ГІБРИД З ГАРНИМ
ФІТОСАНІТАРНИМ ПРОФІЛЕМ**

ГРУПА СТИГЛОСТІ: ранній

ТИП РОСЛИНИ: середньорослий *

- дуже ранній високопродуктивний гібрид
- стабільний і надійний, з високим вмістом олії

**РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ:**

зона достатнього зволоження

000000

55-60 тис./га

зона недостатнього зволоження

00000

50-55 тис./га

РЕЗУЛЬТАТИ УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ

(Урожайність перерахована
на стандартну вологість 7%)




РЕКОМЕНДАЦІЇ:

- рекомендується для зон, де є необхідність в гібридах з коротким вегетаційним періодом, є оптимальним гібридом для посіву озимини
- рекомендований для центрально-західних та північних регіонів

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ



0 — низький показник, 9 — високий показник



Відскануй
і дивись
відео

* висота може змінюватись від азотного живлення, кліматичних умов та вологозабезпечення

* прояв інших фенотипічних та морфологічних ознак залежить від зовнішніх факторів

ЛГ50480



Середня висота
рослини, см

140



Середній діаметр
кошика, см

17



Середня маса
1000 зерен, г

67



Під класичну технологію

**РАННІЙ, НИЗЬКОРОСЛИЙ!
ЗАБЕЗПЕЧИТЬ МАКСИМАЛЬНИЙ
УРОЖАЙ В ПОСУШЛИВИХ
УМОВАХ ТА ЗОНАХ ПОШИРЕННЯ
ВІРУЛЕНТНИХ РАС ВОВЧКА!**

ГРУПА СТИГЛОСТІ: ранній
ТИП РОСЛИНИ: низькорослий для своєї
групи стиглості *

- ранній високопродуктивний гібрид
- високотолерантний до посухи
- високий вихід олії
- гібрид для зон поширення вірулентних рас вовчка
- стійкий до вовчка рас А-G+
- толерантний до основних хвороб
- стійкий до нових рас несправжньої борошнистої роси **

**РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ:**
зона достатнього зволоження

000000

55 тис./га

зона недостатнього зволоження

00000

45-50 тис./га

РЕЗУЛЬТАТИ УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ

(Урожайність перерахована
на стандартну вологість 7%)

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

- рекомендований для Півдня та Сходу України
- пластичний до різних технологій вирощування
- завдяки короткому періоду вегетації можливо використовувати для пізніх та поживних посівів

- придатний для культивування на зрошенні в умовах Півдня та Південного Сходу України
- рекомендується дотримуватись рекомендованої норми висіву

Толерантність до посухи



9

Потенціал урожайності



8

Стабільність урожаю



9

Вміст олії



8

Енергія початкового росту



9

Холодостійкість



8

Стійкість до полегання



9

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Фомопсис (Phomopsis)



8

Біла гниль коріння (Sclerotinia)



8

Біла гниль кошика (Sclerotinia)



8

Вугільна гниль (Macrophomina)



7

Суша гниль (Rhizopus)




8

Фомоз (Phoma)



8

0 — низький показник, 9 — високий показник



* прояв інших фенотипічних та морфологічних ознак залежить від зовнішніх факторів

** стійкість до відомих рас несправжньої борошнистої роси у континентальній Європі на момент реєстрації гібрида





150



17



69,5



(Урожайність перерахована на стандартну вологість 7%)

Толерантність до посухи



- нова генетика Лімагрейн для Степу та Лісостепу України
- максимально розкриває свій потенціал при інтенсивній технології вирощування
- завдяки короткому періоду вегетації, формує ранній стабільний врожай навіть за дуже посушливих умов, можливо використовувати для пізніх посівів

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ



0 — низький показник, 9 — високий показник

Під класичну технологію

**НОВА ГЕНЕТИКА ДЛЯ
ОТРИМАННЯ ВИСОКИХ РАННІХ
ВРОЖАЇВ, ЗА РІЗНИХ УМОВ
ВИРОЩУВАННЯ.**

ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньоранній-ранній
ТИП РОСЛИНИ: Середньорослий
для своєї групи стиглості*

- високопродуктивний гібрид
- високотолерантний до посухи
- висока енергія початкового росту
- гібрид пластичний до умов вирощування
- стійкий до вовчуку рас А-Г
- толерантний до основних хвороб
- стійкий до нових рас несправжньої борошністої роси **

**РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ:**


зона достатнього зволоження

до 55 тис./га

зона недостатнього зволоження

45-50 тис./га

- за цвітінням та збиранням утворює виробничий конвеєр, гарно гармонізує в парі з ЛГ5580 та Тункою
- рекомендується дотримуватись рекомендованої норми висіву



* висота може змінюватись від азотного живлення, кліматичних умов та вологозабезпечення

* прояв інших фенотипічних та морфологічних ознак залежить від зовнішніх факторів.

** Стійкість до відомих рас несправжньої борошнистої роси у континентальній Європі на момент реєстрації гібрида

ЛГ5478



Середня висота
рослини, см

165



Середній діаметр
кошика, см

17



Середня маса
1000 зерен, г

65

Під класичну технологію

**ВИСОКОПРОДУКТИВНИЙ
ІНТЕНСИВНИЙ ГІБРИД! ГАРНЕ
ПОЄДНАННЯ СТАБІЛЬНОСТІ
Й АГРОНОМІЧНИХ ЯКОСТЕЙ**

ГРУПА СТИГЛОСТІ: ранній-середньоранній
ТИП РОСЛИНИ: середньорослий для своєї
групи стиглості *

- високоеурожаєний і стабільний
- стабільно високий результат урожайності
у високоурожаєних умовах
- високий вихід олії
- стійкий до вовчка рас А–F
- толерантний до основних хвороб
- стійкий до нових рас несправжньої
борошнистої роси **

**РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ:**

зона достатнього зволоження



до 55 тис./га

зона недостатнього зволоження



45-50 тис./га

РЕЗУЛЬТАТИ УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ

(Урожайність перерахована
на стандартну вологість 7%)

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

- рекомендований для Лісостепу і Полісся та півночі
Степу України
- рекомендований для інтенсивних технологій
вищівування

- рекомендується дотримуватись рекомендованої
норми висіву

Толерантність до посухи



Потенціал урожайності



Стабільність урожаю



Вміст олії



Енергія початкового росту



Холодостійкість



Стійкість до полягання



ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Фомопсис (Phomopsis)



Біла гниль коріння (Sclerotinia)



Біла гниль кошика (Sclerotinia)



Вугільна гниль (Macrophomina)



Суха гниль (Rhizopus)



Фомоз (Phoma)



0 — низький показник, 9 — високий показник



Відскануй
і дивись
відео

* прояв інших фенотипічних та морфологічних ознак залежить від зовнішніх факторів.

** стійкість до відомих рас несправжньої борошнистої роси
у континентальній Європі на момент реєстрації гібрида





Середня висота
рослини, см

150



Середній діаметр
кошика, см

15,9



Середня маса
1000 зерен, г

73

Під класичну технологію

**ЛІДЕР ПО ЖАРОСТІЙКОСТІ ТА
СТАБІЛЬНОСТІ, ПЛАСТИЧНИЙ
ДО КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН ТА
ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ**

ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньоранній

ТИП РОСЛИНИ: середньорослий для своєї
групи стиглості *

- жаростійкий високопродуктивний гібрид
- перший та найкращий гібрид зі стійкістю до вовчка рас А–G
- пластичний до умов та технологій вирощування
- високотолерантний до посушливих умов

**РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ:**

зона достатнього зволоження

000000

до 55 тис./га

зона недостатнього зволоження

00000

45-50 тис./га

РЕЗУЛЬТАТИ УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ

(Урожайність перерахована
на стандартну вологість 7%)




РЕКОМЕНДАЦІЇ:

- рекомендований для зони Степу
- найкраще рішення для полів, заражених вовчком

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ



0 — низький показник, 9 — високий показник



* висота може змінюватись від азотного живлення, кліматичних умов та вологозабезпечення
* прояв інших фенотипічних та морфологічних ознак залежить від зовнішніх факторів


ЛГ50585

OR-X



Середня висота
рослини, см

178



Середній діаметр
кошика, см

15,7



Середня маса
1000 зерен, г

71



РЕЗУЛЬТАТИ УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ

(Урожайність перерахована на стандартну вологість 7%)

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

- гібрид помірно інтенсивного типу
- рекомендований для вирощування в зоні Степу
- за більш детальною інформацією звертайтеся до регіонального менеджера

Під класичну технологію

**ЧУДОВЕ ПОЄДНАННЯ
ПЛАСТИЧНОСТІ З ВИСОКОЮ
СТІЙКІСТЮ ДО НОВИХ РАС ВОВЧКА**

ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньоранній

ТИП РОСЛИНИ: середньорослий для своєї групи стиглості *

- стійкість до вовчка – програма OR-X
- високий вихід олії
- для регіонів з сильним ураженням вовчком
- оптимальне генетичне розв'язання проблем з вовчком

OR-X програма – це стійкість гібрида до вовчка раси A-G та висока толерантність до наступної, більш агресивної, ніж G раси. Ці гібриди створені на базі нової генетики Ліма-грейн, і отримали свій абсолютно новий рівень генетичного захисту — **OR-X МУЛЬТИТОЛЕРАНТНІСТЬ** – до вовчка шляхом комплексної комбінації різних адитивних генів, скоombінованих селекціонерами в одному продукті.

**РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ:**

зона достатнього зволоження

до 55 тис./га

зона недостатнього зволоження




45-50 тис./га



ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ



0 — низький показник, 9 — високий показник



* висота може змінюватись від азотного живлення, кліматичних умов та вологозабезпечення

* прояв інших фенотипічних та морфологічних ознак залежить від зовнішніх факторів

Нові висоти
першокласного
врожаю

FMC

An Agricultural
Sciences Company

Експрес™ Голд 75, ВГ

Гербіцид

Інноваційна технологія післясходового захисту гібридів соняшника з властивістю Express™ від широкого спектру дводольних бур'янів.

БУДЬ ЛАСКА ЗАСТОСОВУЙТЕ ПРОДУКТИ ВІДПОВІДАЛЬНО ТА БЕЗПЕЧНО.
ДОТРИМУЙТЕСЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ВИРОБНИКА, ЩО ВКАЗАНІ НА ЕТИКЕТЦІ.



Компанія «Лімагрейн» пропонує для аграріїв України ЛГ59580, ЛГ50479 СХ, ЛГ50549 СХ, ЛГ50779 СХ, ЛГ50689 СХ, ЛГ50639 СХ для використання з післясходовим гербіцидом Express® компанії FMC.

Переваги, якими можуть скористатися аграрії при використанні гібридів соняшника ЛГ59580, ЛГ50479 СХ, ЛГ50529 СХ, ЛГ50549 СХ, ЛГ50779 СХ, ЛГ50689 СХ, ЛГ50639 СХ і гербіциду Express® — це боротьба з широким спектром одно- та багаторічних дводольних бур'янів, гнучкість внесення гербіциду у фазі від 2 до 8 листків соняшнику, післясходове використання, відсутність обмежень щодо ротації культур в сівозміні.

До складу Express® входить добре відома діюча речовина трибенурон-метил, що швидко (протягом 3-х годин) зупиняє поділ клітин чутливих видів бур'янів, у результаті чого ріст бур'янів блокується. Видимі симптоми з'являються через 5–8 днів, а повна загибель бур'янів настає через 10–25 днів. Тепла та волога погода підвищує швидкість дії

гербіциду, а прохолодна та суха — уповільнює її. Компанія «Лімагрейн» рекомендує застосовувати Експрес® в нормі до 50 г/га одноразово або роздільно на гібридах ЛГ59580, ЛГ50479 СХ, ЛГ50549 СХ, ЛГ50779 СХ в фазу 2–8 листків. Для максимального контролю бур'янів на полях з високою забур'яненістю рекомендуємо використовувати комбіновану систему захисту, що включає поєднання ґрунтових гербіцидів та післясходового застосування гербіциду Express® у стадії 4–8 листків.

Express® — це торгова марка корпорації FMC, що використовується Limagrain Europe на ліцензійній основі.

ЛГ50549 СХ



Середня висота
рослини, см

162



Середній діаметр
кошика, см

15,8



Середня маса
1000 зерен, г

75

Під технологію Express®

ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньоранній
ТИП РОСЛИНИ: середньорослий для своєї
групи стиглості *

- гібрид стійкий до вовчка рас А-Г
- висока енергія початкового росту
- гібрид під технологію Експрес™
- високоврожайний у своїй групі стиглості, стабільна олійність
- високотолерантний до фомопсису, фомозу
- толерантний до склеротинії кореня
- толерантний до посушливих умов
- пластичний до умов вирощування, висока посухостійкість

**РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ:**
зона достатнього зволоження

000000

до 55 тис./га

зона недостатнього зволоження

00000

45-50 тис./га

РЕЗУЛЬТАТИ УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ


(Урожайність перерахована
на стандартну вологість 7%)

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

- не рекомендується загущувати посіви
- післясходовий період до 50 г/га або Експрес™
Голд 75 ВГ у нормі до 40 г/га
- рекомендується додавати ПАР Тренд 90

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ПОСІВУ

Розподіл території за умовами



Толерантність до посухи



Потенціал урожайності



Стабільність урожаю



Вміст олії



Енергія початкового росту



Холодостійкість



Стійкість до полегання



ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Фомопсис (Phomopsis)



Біла гниль коріння (Sclerotinia)



Біла гниль кошика (Sclerotinia)



Вугільна гниль (Macrophomina)



Суха гниль (Rhizopus)



Фомоз (Phoma)



0 — низький показник, 9 — високий показник

ПАРТНЕРИ:

- у зоні Степу та південного Лісостепу виступає партнером разом з ЛГ59580 та ЛГ50529 СХ з розривом у цвітінні та утворенні збирального конвеєра

ПОЛЬОВІ ПЕРСПЕКТИВИ:

посушливий, невибагливий гібрид, створений для посушливих, степових умов України, та зон поширення вовчка



* висота може змінюватись від азотного живлення, кліматичних умов та вологозабезпечення
* прояв інших фенотипічних та морфологічних ознак залежить від зовнішніх факторів

Оптимізований під гербіцид Express® — торгова марка корпорації FMC, що використовується Limagrain Europe S.A.S та її дочірніми компаніями на ліцензійній основі.

155



15,8



72

до 55 тис./га

зона недостатнього зволоження




45-50 тис./га

65



65



Region	Average Price (2023)
ТОВ «Бера агро»	36 u/ra
ДП «ДГ ПАНФИЛЬСЬКОЇ ДС ННЦ «ІЗ НААН»	34 u/ra
ФГ Базис	42 u/ra
ФГ «Василенко»	40 u/ra
АКПП Золота Нива	39 u/ra
ФГ «Агро Володимир»	45 u/ra
СТОВ «АГРОСС»	34 u/ra

ЛГ50689 СХ



Середня висота
рослини, см

175



Середній діаметр
кошика, см

17



Середня маса
1000 зерен, г

74

Під технологію Express®

ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньостиглий
ТИП РОСЛИНИ: вище середнього для
своєї групи стиглості*

- високопродуктивний гібрид,
інтенсивного типу
- високий вихід олії
- найкраще рішення в зоні поширення
бурої іржі
- стійкий до вовчку рас А-F+
- толерантний до основних хвороб
- стійкий до несправжньої борошністої
роси-MGP**

**РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ:**

зона достатнього зволоження



до 55 тис./га

зона недостатнього зволоження



45-50 тис./га

РЕЗУЛЬТАТИ УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ

(Урожайність перерахована на стандартну вологість 7%)

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

- рекомендований для північно степної та лісостепної зони України
- Рекомендований для інтенсивної та класичної технології вирощування
- Найкраще генетичне рішення для боротьби з несправжньою борошністою росю та бурю іржею.
- Рекомендується дотримуватись рекомендованої норми висіву

Толерантність до посухи



Потенціал урожайності



Стабільність урожаю



Вміст олії



Енергія початкового росту



Холодостійкість



Стійкість до полягання



ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Фомопсис (Phomopsis)



Біла гниль коріння (Sclerotinia)



Біла гниль кошика (Sclerotinia)



Вугільна гниль (Macrophomina)



Суха гниль (Rhizopus)




Фомоз (Phoma)



0 — низький показник, 9 — високий показник

- Пластичний до технології вирощування, високорентабельний гібрид завдяки комплексній толерантності до основних хвороб та високому вмісту олії.
- Рекомендована доза гербіциду Експрес™ 75 ВГ в після сходовий період до 50 г/га.
- Рекомендується додавати ПАР Тренд 90



* висота може змінюватись від азотного живлення, кліматичних умов та вологозабезпечення
** прояв інших фенотипічних та морфологічних ознак залежить від зовнішніх факторів
** стійкість до відомих рас несправжньої борошністої роси у континентальній Європі на момент реєстрації гібрида

Оптимізований під гербіцид Express® — торгова марка корпорації FMC, що використовується Limagrain Europe S.A.S та її дочірніми компаніями на ліцензійній основі.




170



17



65



(Урожайність перерахована на стандартну вологість 7%)

- максимально розкриває потенціал при дотриманні інтенсивної технології вирощування на родючих ґрунтах
- рекомендований для оптимальних строків сіву
- не рекомендуємо загущувати посіви
- доза гербіциду Експрес™ в післясходовий період до 50 г/га
- додавати ПАР Тренд 90

Толерантність до посухи



ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ



0 — низький показник, 9 — високий показник

ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньопізній
ТИП РОСЛИНИ: середньорослий для своєї
групи стиглості *

- гібрид стійкий до вовчка рас А-Г
- гібрид високоолеїнового напрямку
- стійкий до гербициду Експрес™ та Експрес™ Голд 75 ВГ компанії FMC
- високий потенціал врожайності
- гарна толерантність до основних хвороб
- стабільний вміст олеїнової кислоти
- високий вміст олії

**РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ:
зона достатнього зволоження**

до 55 тис./га



зона недостатнього зволоження



50 тис./га

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ПОСІВУ

Розподіл території за умовами



ПАРТНЕРИ:

- у лісостеповій та степовій зоні України виступає партнером разом з ЛГ50475, ЛГ5492 НО КЛ, ЛГ50797 КЛП з розривом у цвітінні та утворенні збирального конвеєра

ПОЛЬОВІ ПЕРСПЕКТИВИ:

найкраще розкриває свій потенціал при дотриманні інтенсивної технології вирощування зі збалансованим живленням.

** стійкість до відомих рас несправжньої борошністої роси у континентальній Європі на момент реєстрації гібрида

ЛГ58390 КЛ



Середня висота
рослини, см

152



Середній діаметр
кошика, см

15,9



Середня маса
1000 зерен, г

71



Під технологію Clearfield®

ГРУПА СТИГЛОСТІ: ранній
ТИП РОСЛИНИ: середньорослий для своєї групи стиглості *

- гібрид стійкий до вовчка рас А-Г, технологія SUNEО
- стабільний урожай в екстремальних умовах Півдня
- стабільний урожай в ранньому КЛ сегменті
- рано звільняє поля, гарний попередник під пшеницю
- високоврожайний у своїй групі стиглості, висока олійність
- пластичний до умов вирощування (висока посухостійкість)
- генетичний Mildew Control-MGP
- висока толерантність до фомозу
- стійкий до нових рас несправжньої борошнистої роси **

**РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ:**

зона достатнього зволоження

000000

до 53 тис./га

зона недостатнього зволоження

00000

45-50 тис./га

РЕЗУЛЬТАТИ УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ

(Урожайність перерахована
на стандартну вологість 7%)



ПАРТНЕРИ

- на Півдні виступає партнером разом з ЛГ5542 КЛ та ЛГ5555 КЛП

ПОЛЬОВІ ПЕРСПЕКТИВИ:

псухостійкий гібрид з високим потенціалом та вмістом олії

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ




0 — низький показник, 9 — високий показник

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ПОСІВУ

Розподіл території за умовами

посушливі зони

зони помірного та достатнього зволоження



* висота може змінюватись від азотного живлення, кліматичних умов та вологозабезпечення
* прояв інших фенотипічних та морфологічних ознак залежить від зовнішніх факторів.

*Унікальний символ Clearfield® - зареєстрована торгова марка BASF. © 2024 BASF. Усі права захищено.



ВОВЧОК СОНЯШНИКОВИЙ

Найчисленніша група облігатних підземних паразитів — вовчкові. Рід вовчків *Orobanch* в порівнянні з іншими родами родини вовчкових відрізняється винятковою різноманітністю видового складу (відомо до 120 видів). Пояснюється це широким ареалом розповсюдження і значним діапазоном у виборі рослин-господарів. Представники роду вовчків паразитують на дикорослих, культурних і бур'янистих рослинах.



Відскануй
і дивись відео



На території нашої країни налічується понад 40 видів вовчка, у тому числі п'ять паразитів культурних рослин. Найбільш шкідливими є наступні види, які вражають технічні, кормові, декоративні, овочеві, баштанні культури: вовчок соняшниковий — *O. cyma*, вовчок гіллястий, або конопляний — *O. ramosa*, вовчок єгипетський, або баштаний — *O. aegyptiaca*, вовчок мутеля — *O. mutellii* і вовчок люцерновий — *O. lutea*.

Стебло вовчка — світло-бурого, жовтуватого, рожевого або синюватого кольору, м'ясисте, пряме розгалужене або нерозгалужене, з потовщеною основою, яка має сисальця, що проникають в тканину кореня рослини-господаря. Висота стебла може сягати 50 см і більше.

За сильного засмічення ґрунту насінням вовчка та за наявності ураженої рослини на одну рослину може припадати до 200 квітконосів паразита і біль-

ше. Оцвітини вовчка пазушні, п'ятичленні, з двогубим віночком синього, білуватого або фіолетового кольору, зібрані по кілька десятків на колос або колосоподібне суцвіття. Вони здатні до самозапилення в тому випадку, якщо не було перехресного запилення, що здійснюється за допомогою вовчкової мухи-фітомізи — *phytomya orobanchia* — і джмелів. Плід — коробочка, що розкривається двома або трьома стулками і містить понад 2 тис. насінин. Насіння надзвичайно дрібне, довжина — 0,2–0,6 мм, ширина — 0,17–0,25 мм, округле або довгасте, темно-бурого кольору, з комірчастою поверхнею. На одній рослині вовчка їх може бути до 100 тис. Майже всі види вовчка є відносно вузькоспеціалізованими. Кожен вид пристосований до паразитування на обмеженій кількості рослин-господарів, що належать лише до одного або декількох певних родин, родів та видів.

Вовчок соняшниковий відрізняється від інших видів вовчка нерозгалуженим стеблом заввишки до 50 см і вище. Вид добре розвивається на культурних і дикорослих представниках родини пасльонових і складноцвітих. Серед них — соняшник, тютюн, махорка, томат, бурolistка, сафлор, полин морський, полин австралійський, полин гіркий, полин звичайний, дурнишник звичайний, великоголовник солончаковий, ромашка непахуча, айстра солончакова.

Вовчок соняшниковий не вражає рицину, сою, лялеманцію, капусту, картоплю, гірчицю. Вовчок єгипетський, або баштаний, вражає близько 70 видів рослин, у тому числі картоплю, тютюн, капусту, томат, гарбузові. Вовчок гіллястий, або конопляний, вражає в основному тютюн, томат, а також коноплі, капусту, моркву, диню тощо.



Спеціалізація вовчка змінювалася в процесі еволюції, чому сприяв природний відбір і діяльність людини. Поряд з новими формами рослин в процесі постійно мінливих взаємовідносин паразита і господаря виникали й поширювалися нові фізіологічні популяції та раси паразита, які відрізняються вірулентністю і здатністю долати захисні властивості організму рослини-господаря. Кількість рас паразитарного виду в певному районі визначається тривалістю обробітку рослини-господаря і різноманітністю її генотипів.

Поява нових, найбільш агресивних рас вовчка, призводить до того, що сорти та гібриди втрачають імунітет. Розвиток паразита визначається не лише імунологічними властивостями рослини-господаря, але і строками сівби, родючістю ґрунту, залишком його насіння в ґрунті, глибиною залягання цього насіння, структурою кореневої системи рослини, кількістю вологи

в ґрунті тощо. Залежно від біології рослини-господаря, у вовчка з'явилися багаторічні, дворічні, однорічні форми та навіть ефемери. Відмінними ознаками окремих видів вовчка є морфологія стебла й оцвітини, а також паразита - рна спеціалізація. Легке, як пил, насіння вовчка вільно розноситься вітром, водою, чіпляється з ґрунтом до взуття, до знарядь праці, органів рослин, що роблять запаси, переноситься пиловими бурями на величезні відстані.

Оптимальна температура для проростання насіння вовчка — 22–25°C. Воно не проростає за температури нижче 20°C і вище 45°C, деяке — вище 50°C. Насіння вовчка здатне прорости на будь-якій глибині орного шару під впливом корневих виділень певних видів рослин-господарів. Якщо поблизу насіння вовчка таких рослин немає, то воно не проростає, однак може зберігати життєздатність протягом 8–12 років. За даними деяких до-

слідників, з підвищенням концентрації корневих виділень до певної межі збільшується і відсоток пророслого насіння. У менш зволоженому ґрунті концентрація корневих виділень буде вищою, тому особливо значне виснаження соняшника вовчком спостерігається в посушливі роки.

Заходи боротьби із вовчком

Для захисту від квіткових паразитів використовують комплекс заходів:

- введення сівозміни, що виключає уражені культури на тривалий термін (не менше 6–8 років);
- обробіток гібридів соняшника стійких до нових рас вовчка;
- використання виробничої системи Clearfield®.

Оскільки вовчок вражає різні дикорослі рослини, боротьба з ним — обов'язкова ланка в системі заходів захисту.

ЛГ5542 КЛ



Середня висота
рослини, см

152



Середній діаметр
кошика, см

15,9



Середня маса
1000 зерен, г

71



SUNEO
Trends in Energy Efficiency

Під технологію Clearfield®

**СТВОРЕНИЙ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ
В СКЛАДНИХ УМОВАХ ПІВДНЯ
ТА СХОДУ**

ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньоранній

ТИП РОСЛИНИ: середньорослий *

- гібрид зі стійкістю до гербіциду Євро-Лайтнінг® виробничої системи Clearfield®
- стійкий до вовчка рас А–Г
- пластичний до умов вирощування
- високотолерантний до посухи
- придатний для різних технологій вирощування

**РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ:**

зона достатнього зволоження

до 53 тис./га

зона недостатнього зволоження

45-50 тис./га

РЕЗУЛЬТАТИ УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ

(Урожайність перерахована на стандартну вологість 7%)

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

- рекомендований для Півдня та Сходу України, для зон, уражених вовчком
- не рекомендується загущення посівів

Толерантність до посухи

● ● ● ● ● ● ● ● ● 9

Потенціал урожайності

Стабільність урожаю

Вміст олії

Енергія початкового росту

Холодостійкість 

Стійкість до полягання

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Фомопсис (Phomopsis)

Біла гниль коріння (Sclerotinia)


Біла гниль кошика (Sclerotinia)

Вугільна гниль (Macrophomina)

Суха гниль (*Rhizopus*)

Фомоз (Phoma)

0 — низький показник, 9 — високий показник



* прояв інших фенотипічних та морфологічних ознак залежить від зовнішніх факторів

*Унікальний символ Clearfield® - зареєстрована торгова марка BASF. © 2024 BASF. Усі права захищено.

ЛГ58630 КЛ



Середня висота
рослини, см

161



Середній діаметр
кошика, см

16,7



Середня маса
1000 зерен, г

60



РЕЗУЛЬТАТИ УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ

(Урожайність перерахована на стандартну вологість 7%)

ПАРТНЕРИ

- в зоні північного степу виступає партнером разом з ЛГ 5542 КЛ, ЛГ 50455 КЛП, ЛГ 5555 КЛП
- в зоні Лісостепу виступає партнером разом з ЛГ 50455 КЛП, ЛГ 50635 КЛП, ЛГ 50550 КЛП

Толерантність до посухи



РЕКОМЕНДАЦІЇ:

- максимально розкриває потенціал при дотриманні інтенсивної ехнології вирощування
- рекомендований для лісостепу, можливість вирощувати в степу та поліссі при дотриманні рекомендацій

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ



0 — низький показник, 9 — високий показник

Під технологію Clearfield®

ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньостиглий
ТИП РОСЛИНИ: середньорослий для своєї
групи стиглості *

- гібрид стійкий до вовчка рас A-G , технологія SUNEO
- стабільний врожай в різних зонах вирощування завдяки толерантності до основних хвороб, посухостійкості, стійкості до вовка та високому потенціалу.
- нова генетика в класичному КЛ сегменті!
- високорожайний у своїй групі стиглості, висока олійність
- генетичний Mildew Control - MGP
- висока толерантність до фомопсису
- стійкий до нових рас несправжньої борошністої роси **

**РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ:**

зона достатнього зволоження



до 55 тис./га

зона недостатнього зволоження

45-50 тис./га

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ПОСІВУ

Розподіл території за умовами



*Унікальний символ Clearfield® - зареєстрована торгова марка BASF. © 2024 BASF. Усі права захищено.





ЛГ50455 КЛП



Clearfield® Plus
Высокая система



Під технологію Clearfield® Plus



Середня висота
рослини, см

153



Середній діаметр
кошика, см

17



Середня маса
1000 зерен, г

73



РЕЗУЛЬТАТИ УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ

(Урожайність перерахована на стандартну вологість 7%)

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

- рекомендований для Степу, Лісостепу та Полісся
- рекомендується для зон, де є необхідність в гібридах з коротким вегетаційним періодом
- рано звільняє поля, ідеально підходить для посіву озимої пшениці
- рекомендований для інтенсивних та класичних технологій вирощування

Толерантність до посухи



ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Фомопсис (Phomopsis)



0 — низький показник, 9 — високий показник

ГРУПА СТИГЛОСТІ: ранній
ТИП РОСЛИНИ: середньорослий для своєї
групи стиглості *

- **ранньостиглий гібрид з високим потенціалом врожайності**
- **найвищий урожай в ранньому КЛП сегменті**
- **широкорайонований гібрид з гарною посухостійкістю та толерантністю до хвороб**
дуже висока енергія початкового росту на початку вегетації
- **пластичний до термінів сівби**
- **високий вихід олії**
- **стійкий до вовчка рас А-Г**
- **стійкий до нових рас несправжньої борошністої роси ****

**РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ:**


зона достатнього зволоження

до 55 тис./га

зона недостатнього зволоження

45-50 тис./га

- рекомендується дотримуватись рекомендованої норми висіву
- завдяки короткому періоду вегетації можливо використовувати для пізніх та поживних посівів



** стійкість до відомих рас несправжньої борошністої роси у континентальній Європі на момент реєстрації гібрида

*Унікальні символи Clearfield® Plus та Clearfield® - зареєстровані торгові марки BASF. © 2024 BASF. Усі права захищено.



Середня висота
рослини, см

140



Середній діаметр
кошика, см

15,8



Середня маса
1000 зерен, г

71



РЕЗУЛЬТАТИ УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ

(Урожайність перерахована на стандартну вологість 7%)

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

- рекомендований для Півдня та Сходу України, для зон, уражених вовчком
- придатний для культивування на зрошенні в умовах Півдня та Південного Сходу України

- рекомендується дотримуватись рекомендованої густоти на момент збирання
- завдяки короткому періоду вегетації можливо використовувати для пізніх та пожнивних посівів

Толерантність до посухи	8
Потенціал урожайності	8
Стабільність урожаю	8
Вміст олії	8
Енергія початкового росту	8
Холодостійкість	7
Стойкість до полегання	7

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ	
Фомопсис (Phomopsis)	7
Біла гниль коріння (Sclerotinia)	7
Біла гниль кошика (Sclerotinia)	7
Вугільна гниль (Macrophomina)	7
Суша гниль (Rhizopus)	7
Фомоз (Phoma)	7

0 — низький показник, 9 — високий показник

0 — низький показник, 9 — високий показник

Під технологію Clearfield® Plus

ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньоранній-ранній
ТИП РОСЛИНИ: середньорослий для своєї
групи стиглості *

- гібрид зі стійкістю до гербіциду Євро-Лайтнінг® Плюс виробничої системи Clearfield® Plus
- екологічно-пластичний до умов вирощування
- високотолерантний до посухи
- пластичний до різних технологій вирощування
- стійкий до вовчка рас А–G
- гібрид технології SUNEО® для півдня України, економічно використовує запас накопиченої ґрунтової вологи

**РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ:**


зона достатнього зволоження

до 53 тис./га

зона недостатнього зволоження



45-50 тис./га



ТЕХНОЛОГІЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВРОЖАЮ

Ексклюзивний продукт від
компанії «Лімагрейн»



Геннадій Потоцький

Спеціаліст із розвитку соняшника
у Східній Європі, компанія
«Лімагрейн Європа»

У 2014 році компанія «Лімагрейн» презентувала на європейському ринку новий ексклюзивний проєкт — SUNEО. В Україні ми також маємо можливість реалізувати цей унікальний проєкт і представити на ринку його продукти.



НАЙКРАЩА ГЕНЕТИКА КОМПАНІЇ «ЛІМАГРЕЙН» ПОЄДНУЄ:

- Останній ген стійкості до вовчка
- Clearfield®-технологію

Перевагою цієї технології є її стійкість.

Що вона собою являє:

- подвійний захист для контролю вовчка

Що ж особливого в цьому проєкті, яку мету ми ставили перед собою та селекціонерами, створюючи цей продукт і виводячи його на ринок, які властивості мають нові продукти, а головне — які переваги може отримати сільськогосподарський виробник, використовуючи запропоновані нами гібриди?

Почнемо з назви проєкту: SUN — скорочено від “sunflower” — соняшник, і NEO — це все те нове, краще і прогресивне, що наша компанія має у своєму арсеналі й прагне запропонувати своїм клієнтам.

У чому ж унікальність цього проєкту і які його цільові ринки?

На сьогодні в Україні соняшник культивується більш ніж на 6 мільйонах гектарів, і близько 70% відсотків цієї території заражені вовчком соняшниковим (*Orobanche cunana*). Це зараження має різні ступені й спричинено різними расами, і скрізь, де проявляється вовчок, особливо нові агресивні раси, він може завдати непоправної шкоди врожаю. Такий ризик поширення вовчка більш вірулентних рас, ніж E, наявний приблизно на 38% від загальної площі соняшника, що становить понад 2,2 мільйона гектарів посівних площ. Приблизно така ж площа посівів соняшника — до 70% — страждає й від посушливих умов.

Саме для цих цільових ринків компанія «Лімагрейн» і пропонує гібриди проєкту SUNEО. У чому ж суть цієї пропозиції?

Наша компанія на базі своєї найкращої генетики, що завоювала популярність в аграріїв багатьох країн світу завдяки своїй посухостійкості та пластичності, створила унікальні гібриди, які поєднують в собі останній ген стійкості до вовчка, наявний у компанії, і Clearfield/Clearfield Plus-технологію. Наразі для аграріїв України ми пропонуємо гібриди, які містять всі наведені вище переваги та стійкість до вовчка A–G рас. Але ми не зупиняємось, і надалі під міститимуть брендом будуть запропоновані SUNEО продукти нового покоління, які міститимуть наступний ген чи комплекс генів з толерантністю до вовчка більше G раси.

Зона ефективності

SUNEО
Технологія захисту врожаю

3 рішення — ключі
до застосування





ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ САНЕО

- захист від вовчка
- захист від бур'янів
- стійкість до посухи



Генетика

Ген
стійкості
до вовчка



Clearfield®
Bayer Crop Science

ЛГ50475

NOV
High Oleic Value



Середня висота
рослини, см

165



Середній діаметр
кошика, см

17



Середня маса
1000 зерен, г

65



РЕЗУЛЬТАТИ УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ

(Урожайність перерахована
на стандартну вологість 7%)



РЕКОМЕНДАЦІЇ:

- для оптимальних та оптимально пізніх строків сіву. Завжди гарно озернений кошик, не рекомендуємо загущувати посіви
- середньоранній-ранній, легко конкурує з середньостиглими та середньопізними гібридами на Півночі, Центрі та Півдні України

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ



0 — низький показник, 9 — високий показник

Під класичну технологію
Високоолеїнові гібриди

**ВИСОКОПРОДУКТИВНИЙ ІНТЕНСИВНИЙ
ВИСООЛЕЇНОВИЙ ГІБРИД! ГАРНЕ
ПОЄДНАННЯ СТАБІЛЬНОСТІ І
АГРОНОМІЧНИХ ЯКОСТЕЙ**

ГРУПА СТИГЛОСТІ: ранній - середньоранній
ТИП РОСЛИНИ: низькорослий для своєї групи
стигlosti *

- гібрид високоолеїнового напрямку під класичну технологію вирощування
- гібрид стійкий до вовчка рас А-Ф
- найвищий потенціал врожайності серед НО гібридів
- гарна комплексна толерантність до основних хвороб
- стабільний вміст олеїнової кислоти
- високий вміст олії
- пластичний до умов вирощування (висока посухостійкість)
- генетичний Mildew Control-MGP
- дуже рано формує врожай, добре озернений-виповнений кошик
- стійкий до нових рас несправжньої борошнистої роси **

**РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ:**
зона достатнього зволоження

○○○○○○○

до 55 тис./га

зона недостатнього зволоження


○○○○○

45-50 тис./га

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ПОСІВУ

Розподіл території за умовами

посушливі зони достатнього зволоження



* висота може змінюватись від азотного живлення, кліматичних умов та вологозабезпечення

* прояв інших фенотипічних та морфологічних ознак залежить від зовнішніх факторів

** стійкість до відомих рас несправжньої борошнистої роси у континентальній Європі на момент реєстрації гібрида



82



СТАБІЛЬНИЙ УРОЖАЙ

ВИСОКИЙ РІВЕНЬ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ

СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА

СТІЙКІСТЬ ДО НЕСПРАВЖНЬОЇ
БОРОШНИСТОЇ РОСИ

ПОСУХОСТІЙКІСТЬ

ОЛІЙНІСТЬ

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ



Соняшник селекції Лімагрейн



Відстеження індексу NDVI

Динаміка розвитку соняшнику


ЛГ50479 СХ

Дата посіву: 02.05.2023

Локація: Ружинський р-н, Житомирська обл.

Площа: 87 га

Зразок знімка: 25.05.2023



Зразок знімка: 06.06.2023




Зразок знімка: 14.06.2023



Зразок знімка: 04.07.2023



Зразок знімка: 29.07.2023




Зразок знімка: 15.08.2023



ЕВОЛЮЦІЯ ВЕГЕТАЦІЙНОГО ІНДЕКСУ

— Середнє по полю



Супутниковий моніторинг індексу рослинності (NDVI Index), на гібриді соняшнику ЛГ50479 СХ, підтверджує основні характеристики даного гібриду та демонструє його потужний розвиток, навіть за стресових погодних умов.



ТОВ «Лімагрейн Україна»
Київ – Україна – 04053
вул. Тургенєвська, 55
тел. / факс: +38 044 484-67-76
тел.: +38 044 339-97-97
e-mail: Limagrain.ukraine@limagrain.com

Для нотаток:



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ КОМПАНІЇ «ЛІМАГРЕЙН»

ГІБРИД	ЛГ5377	ЛГ50480	ЛГ50450 новинка	ЛГ5478	ЛГ50500 новинка	ЛГ50514	ТУНКА	ЛГ50616 новинка	ЛГ50621 новинка	ЛГ50510	ЛГ50585
ПІД КЛАСИЧНУ ТЕХНОЛОГІЮ											
Група стиглості	Р	Р	Р-СР	СР	СР	СР	СР	СР	СР	СР	СР
Висота рослини	середньо- рослий	низько- рослий	середньо- рослий	середньо- рослий	середньо- рослий	середньо- рослий	середньо- рослий	середньо- рослий	вище серед- нього	середньо- рослий	середньо- рослий

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:											
Толерантність до іржі					висока	висока		висока			
Середня висота рослини, см	155	140	150	165	159	155	150	163	173	160	178
Середній діаметр кошика, см	15,9	17	17	17	18	16,7	15,9	17,3	15,7	17,5	15,7
Середня маса 1000 зерен, г	70	67	69,5	65	60	62	73	60	61	68	71
Толерантність до посухи	8	9	9	8	8	8	9	9	—	8	9
Потенціал урожайності	8	8	9	9	8	8	8	9	8	9	9
Стабільність урожаю	8	9	9	8	9	9	9	9	8	9	8
Вміст олії	9	8	8	9	9	9	8	9	8	8	9
Енергія початкового росту	9	9	8	9	8	9	9	9	8	8	8
Холодостійкість	9	8	8	8	8	8	8	8	7	9	7
Стійкість до полегання	8	9	8	8	9	9	7	9	7	8	7

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ЗАХВОРИЮВАНЬ:												
Фомопсис (Phomopsis)		9	8	8	9	8	9	7	9	7	8	8
Біла гниль коріння (Sclerotinia)		8	8	7	8	8	8	7	7	7	7	7
Біла гниль кошика (Sclerotinia)		9	8	7	8	7	7	7	8	7	8	7
Вугільна гниль (Macrophomina)		8	7	8	8	7	7	7	7	9	8	7
Суха гниль (Rhizopus)		7	8	8	7	8	7	7	8	8	8	8
Фомоз (Phoma)		8	8	8	8	7	8	7	8	8	8	7
Стійкість до вівчу		—	A-G+	A-G	A-F	A-F	A-G	A-G	A-G	A-G+	A-F до G толерант- ність	OR-X
Рекомен- дована густота на момент збирання	Зона достатнього зволоження, тис./га	55-60	до 55	до 55	до 55	до 55	до 55	до 55	до 55	до 55	до 55	до 55
	Зона недо- статнього зволоження, тис./га	50-55	45-50	45-50	45-50	45-50	45-50	45-50	45-50	45-50	50	45-50
Особливості		Ранній, високо потенційний гібрид з гарним фотосанітарним профілем.	Ранній, низькорослий! Забезпечить маско- мальний урожай в посушливих умовах та зонах поширення вразливих рас вівчу!	Нова генетика для отримання високих ранніх врожаїв, за різних умов вирощування	Високоефективний інтенсивний гібрид! Гарне поєднання стабільності і агрономічних якостей.	Рішення для фермерів, в зонах поширення бурої іржі з бонусом за олійність.	Пластичний, широко районований гібрид. Висока толерантність до іржі та високий вміст олії!	Лідер по жаростійкості та стабільності, пластичний до кліматичних змін та технологій вирощування	Висока толерантність до іржі та високий вміст олії	Чудове поєднання пластичності з високою стійкістю до нових рас вівчу	Для інтенсивних умов та високотехнологічних господарств Центр, Півночі та Заходу Укра- їни. Високоефективний та пластичний, гарна толерантність до основних хвороб	Чудове поєднання пластичності з високою стійкістю до нових рас вівчу

Середньостиглий /Середне = С
Середньоранній = СР
Середньопізній = СП

Середне-середньопізнє = С-СП
Оптимальні - пізні = ОП
Середньоранні - середньопізні = СР-СП

ЛГ50479 СХ	ЛГ50549 СХ новинка	ЛГ59580	ЛГ50639 СХ новинка	ЛГ50689 СХ новинка	ЛГ50779 СХ новинка	ЛГ5542 КЛ	ЛГ58390 КЛ новинка	ЛГ58630 КЛ новинка	ЛГ50455 КЛП	ЛГ5555 КЛП	ЛГ50550 КЛП новинка	ЛГ50635 КЛП	ЛГ50475 новинка	ЛГ5492ХО КЛ	ЛГ50797 КЛП
ПІД ТЕХНОЛОГІЮ EXPRESS®						ПІД ТЕХНОЛОГІЮ CLEARFIELD®			ПІД ТЕХНОЛОГІЮ CLEARFIELD® PLUS			ВИСОКОЕЛІВНІ ГІБРИДИ			
СР	СР	СР	СР	СР	СП	СР	Р	С	Р	СР	СР	СР	Р	С	СП
середньо-рослий	середньо-рослий	середньо-рослий	вище середнього	вище середнього	вище середнього	середньо-рослий	середньо-рослий	середньо-рослий	середньо-рослий	низько-рослий	середньо-рослий	середньо-рослий	середньо-рослий	середньо-рослий	середньо-рослий

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:															
				висока								висока			
															
163	162	155	171	175	170	152	152	161	153	140	155	147	165	162	170
18	15,8	15,8	18,2	17	17	15,9	15,9	16,7	17	15,8	17	17	17	16	17
65	75	72	65	74	55	71	71	60	73	71	73	73	65	71	65
8	9	9	8	8	8	9	9	8	9	8	9	8	8	8	8
9	9	9	9	8	9	8	8	9	8	8	8	9	9	8	9
9	8	8	9	9	8	8	8	9	9	8	9	9	8	8	8
9	8	8	8	9	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9
9	9	9	8	8	9	8	8	8	9	8	9	8	9	8	8
8	8	8	7	8	8	7	7	9	9	7	9	9	8	8	8
8	7	7	7	8	7	7	7	8	8	7	8	8	8	8	7

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ЗАХВОРЮВАНЬ:															
9	7	7	8	8	8	7	7	8	8	7	8	9	9	9	8
8	7	7	7	7	8	7	7	7	8	7	8	8	8	7	8
8	7	7	7	8	7	7	7	8	8	7	8	8	8	8	7
8	8	7	8	8	8	7	8	8	8	7	8	8	8	8	8
7	7	7	8	7	8	7	7	7	7	7	7	8	7	7	8
8	7	7	7	8	7	7	7	8	8	7	8	8	8	8	7
A-F	A-G	A-G	A-G	A-F+	A-G	A-G	A-G	A-G	A-G	A-G	A-G	A-G	A-F	A-G	A-G
до 55	до 55	до 55	до 55	до 55	до 55	до 53	до 53	до 55	до 55	до 55	до 55	55-60	до 55	до 55	до 55
45-50	45-50	45-50	45-50	45-50	50	45-50	45-50	45-50	45-50	45-50	45-50	50	45-50	45-50	50
ТДП (температура) - температура, при якій починається розвиток хвороби. Висока толерантність до основних інфекційних хвороб, шкідливості до несприятливих умов, висока толерантність до засолених ґрунтів, висока толерантність до засолених ґрунтів, висока толерантність до засолених ґрунтів. Новинка для Півдня та Сходу України під технологію ExpressSun. Сумарна доза внесення гербіциду Експрес 75 в г до 50 г/га. Розроблений для Пд України під технологію ExpressSun. Сумарна доза внесення гербіциду Експрес 75 в г до 50 г/га. Новинка під технологію Express Sun, унікальне поєднання продуктивності, посухостійкості та пластичності. Висока продуктивність та висхідність у зонах. Нахил до генетичного контролю бур'янів та інших основних інфекційних хвороб, технологія ExpressSun. Сумарна доза внесення до 50 г/га. Гарне поєднання агрономічних показників: високий міст олеїнової кислоти, потенціал та толерантність до основних хвороб. Гібрид технології SUNEO®. Спеціально розроблений для вирощування в важких умовах підлітків, висока толерантність до засолених ґрунтів, висока толерантність до засолених ґрунтів, висока толерантність до засолених ґрунтів. Ранній посухостійкий гібрид КЛП, ідеально підходить для зон, де є необхідність в гібридах з коротким вегетаційним періодом, високим потенціалом та високим олії. Новинка в КЛП сегменті, високопотенційний посухостійкий гібрид інтенсивного типу. Новинка! Ранній широкорозриваний гібрид КЛП, ідеально підходить для зон, де є необхідність в гібридах з коротким вегетаційним періодом. Гібрид технології SUNEO® для півдня України, економічно використовує запас вологої ґрунтової вологої. Максимально розкриває потенціал при догляді інтенсивною технологією вирощування, наприклад, високим рівнем мінерального живлення. Стабільний та пластичний гібрид для умов достатнього зволоження з дуже високою толерантністю до хвороб та високим потенціалом урожайності. Високопродуктивний інтенсивний високоелівновий гібрид! Гарне поєднання стабільності агрономічних показників. Гібрид з високими інтегрованими показниками для Центр України та Півночі і Центру Степової зони. Новинка, інтенсивний гібрид технології SUNEO® висхідний гібрид для лісостепу України.															

Ранні - середньопізні = **Р-СП**
Ранній - середньоранній = **Р-СР**
Ранній = **Р**

