



Каталог гібридів
**СОНЯШНИКУ
ТА КУКУРУДЗИ**

syngenta®

НАСІННЯ КУКУРУДЗИ

Акція «З повним баком 2026» від «Сингента»	66
Артезіан™	68
Зведена таблиця характеристик гібридів кукурудзи	71
СИ Шикарі ФАО 200	72
СИ Інвіктус ФАО 210	73
СИ Феномен ФАО 220	74
СИ Амбатор ФАО 230	75
СИ Фрегат ФАО 250	76
СИ Пандорас ФАО 250	77
СИ Олівія ФАО 260	78
СИ Амфора ФАО 260	80
СИ Фортаго ФАО 260	81
СИ Памплони ФАО 270	82
СИ Фігура ФАО 280	83
СИ Чорінтос ФАО 290	84
СИ Скорпіус ФАО 290	85
СИ Гранаріс ФАО 300	86
СИ Еленор ФАО 300	88
Спектрал ФАО 320	89
СИ Електрон ФАО 320	90
СИ Топаз ФАО 340	92
СИ Артос ФАО 370	93
Препарати і строки їх застосування на кукурудзі	94



Акція «З повним баком 2026» від «Сингента»

Новинки кукурудзи заправляють до повного!

Купуйте новинки гібридів кукурудзи та отримуйте гривневий сертифікат на заправку будь-яким видом пального на АЗК «ОККО».

1 п. о. Акційної продукції = 230 грн

ГІБРИДИ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ В АКЦІЇ:

СИ Олівія (ФАО 260) НОВИНКА

Спектрал (ФАО 320) НОВИНКА

СИ Фігура* (ФАО 280) НОВИНКА

СИ Електрон* (ФАО 320) НОВИНКА

СИ Еленор (ФАО 300) НОВИНКА

СИ Топаз (ФАО 340) НОВИНКА

СИ Гранаріс (ФАО 300)

СИ Артос (ФАО 370) НОВИНКА

ЗРОБІТЬ ЧОТИРИ ПРОСТІ КРОКИ Й ОТРИМАЙТЕ ВИГОДУ:

- ✓ **Крок 1:** Підпишіть ваучер програми «Агропартнер» компанії «Сингента» на придбання Акційної продукції** до 15.11.2025 в офіційних дистриб'юторів та субдистриб'юторів.
- ✓ **Крок 2:** Придбайте у сезоні 2025–2026 не меншу кількість п. о. гібридів кукурудзи (Акційна продукція та/або інші гібриди кукурудзи разом), ніж було придбано в сезоні 2024–2025.
- ✓ **Крок 3:** Надайте Організатору скани підписаних видаткових накладних на придбання Акційної продукції в сезоні 2025–2026.
- ✓ **Крок 4:** Передайте Організатору оригінал підписаного уповноваженою особою Учасника Акта приймання-передачі.

Виконання цих кроків гарантує отримання Винагороди*** 230 грн за кожну придбану п. о. Акційної продукції з переліку, наведеного вище.

Гривневий сертифікат із зазначеною загальною сумою Винагороди на заправку будь-яким наявним видом пального на АЗК «ОККО» надається представниками «Сингента».

ВАЖЛИВО:

- Акційна пропозиція обмежена.
- Пропозиція діє при купівлі в офіційних дистриб'юторів та субдистриб'юторів.
- Винагорода нараховується і надається тільки після виконання всіх кроків, зазначених вище.

Не втрачайте можливість отримати додаткові бонуси — приєднуйтеся до Акції вже сьогодні!

АКЦІЯ ДІЄ З 01.09.2025 РОКУ ПО 29.05.2026 РОКУ.

За детальною інформацією звертайтеся до представників компанії «Сингента» або за QR-кодом.

* Державна реєстрація цього гібрида та внесення його до Державного реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні, планується в грудні 2025 року. Цей гібрид буде доступний до продажу лише після державної реєстрації.

** Акційна продукція — насіння гібридів кукурудзи компанії «Сингента», що беруть участь в Акції.

*** Винагорода — сертифікат багаторазового використання, який надає право його пред'явнику на отримання знижки від існуючих цін у розмірі, вказаному в Сертифікаті, на будь-який наявний у мережі АЗК «ОККО» вид пального.



АКЦІЯ

Купуйте новинки гібридів кукурудзи та отримуйте гравневий сертифікат на заправку будь-яким видом пального на АЗК «ОККО». 1 п. о. = 230 грн на пальне.

З ПОВНИМ БАКОМ 2026

Новинки кукурудзи
заправляють
до повного



= 230 грн



Гібриди, що беруть участь в Акції:

НОВИНКА СИ Олівія (ФАО 260)

СИ Гранаріс (ФАО 300)

НОВИНКА СИ Топаз (ФАО 340)

НОВИНКА СИ Фігура* (ФАО 280)

НОВИНКА СИ Спектрал (ФАО 320)

НОВИНКА СИ Артос (ФАО 370)

НОВИНКА СИ Еленор (ФАО 300)

НОВИНКА СИ Електрон* (ФАО 320)



Акція діє з 01.09.2025 по 29.05.2026.

Акційна пропозиція обмежена.

* Державна реєстрація цього гібрида та внесення його до Державного реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні, планується в грудні 2025 року.

syngenta.



Артезіан™ — це бренд інноваційних гібридів кукурудзи від Syngenta, що характеризуються підвищеною ефективністю використання води та генотипи яких забезпечують збереження закладеного врожаю протягом усього сезону. Ці гібриди є результатом програм, присвячених вивченню та оптимізації водоспоживання рослин, що поєднує найсучасніші технології селекції.

Гібриди Артезіан™ повністю забезпечують фермерам можливість досягти виробничих цілей завдяки вищій ефективності перетворення вологи на зерно


У наукових лабораторіях аналізують геноми кукурудзи Артезіан™ і виявляють гени, які підвищують здатність витримувати несприятливі умови

За несприятливих умов такі генотипи здатні посилювати експресію гормонів, що активують механізми пристосування до несприятливих умов

Нормальний перебіг фізіологічних процесів у рослині підтримується протягом довшого періоду після настання стресової дії посухи

Визнанню кожного нового гібрида кукурудзи придатним для вирощування в Україні передують титанічна праця науковців з вивчення його адаптивності до кліматичних особливостей різних зон, пов'язаних головню з фотоперіодичною реакцією, скоростиглістю, холодостійкістю, стійкістю до посухи.

Завдяки великим успіхам у створенні гібридів кукурудзи Артезіан™, адаптованих до стресових чинників, сьогодні компанія «Сингента» пропонує ефективний шлях підвищення рівня урожайності і рентабельності вирощування цієї культури.



Портфоліо гібридів кукурудзи

ТИП АДАПТИВСТІ	АРТЕЗІАН™	ГІБРИД	ФАО	НОВИНКИ	ЛІДЕРИ ПРИБУТКОВСТІ	ОЩАДЛИВИЙ ВИБІР	СИЛОС ТА БЮГАЗ	КРУПА	СПИРТ ТА БІОЕТАНОЛ
ІНТЕНСИВНИЙ	-	СИ Памплона	270			●			●
	-	Спектрал НОВИНКА	320	●	●				●
	-	СИ Топаз НОВИНКА	340	●	●				
	-	СИ Артос НОВИНКА	370	●	●				
ПОМІРНО-ІНТЕНСИВНИЙ	● Артезіан™	СИ Шикарі	200			●			
	-	СИ Інвіктус	210			●	●	●	
	● Артезіан™	СИ Феномен	220			●			
	● Артезіан™	СИ Фрегат	250		●				●
	-	СИ Пандорас	250			●	●	●	
	● Артезіан™	СИ Олівія НОВИНКА	260	●	●				
	-	СИ Амфора	260				●		
	-	СИ Фігура НОВИНКА	280	●	●				
	● Артезіан™	СИ Чорінтос	290			●			
	-	СИ Еленор НОВИНКА	300	●	●				
ВИСОКОАДАПТИВНИЙ	● Артезіан™	СИ Електрон НОВИНКА	320	●	●				
	-	СИ Амбадор	230			●			
	● Артезіан™	СИ Фортаго	260			●			
	● Артезіан™	СИ Скорпіус	290			●			
	● Артезіан™	СИ Гранаріс	300		●				●

Зведена таблиця характеристик гібридів кукурудзи

ТИП АДАПТИВНОСТІ	АРТЕЗІАН™	ГІБРИД	ФАО	ВИКОРИСТАННЯ	ТИП ЗЕРНА	БАЛ (ЗА 9-БАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ)						ГУСТОТА, НА ПЕРІОД ЗБИР., ТИС. РОСЛ./ГА				ПРИДАТНІСТЬ ДО:		ВМІСТ В ЗЕРНІ, %	
						ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ	ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	ВОЛОГОВІДДАЧА	ТЕМП ПОЧАТКОВОГО РОСТУ	СТІЙКІСТЬ ПРОТИ		УМОВИ ВОЛОГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ							
										КОРЕНЕВИХ ТА СТЕБЛОВИХ ГНІЛЕЙ	САЖКОВИХ ХВОРОБ	ДОСТАТНІ	НЕСТІЙКІ	НЕДОСТАТНІ	МОНОКУЛЬТУРИ	ПЕРЕСТОЮ НА КОРЕНІ	КРОХМАЛЬ	БІЛОК	
ІНТЕНСИВНИЙ	-	СИ Памплона	270	Зерно	Зуб.	7	8	9	8	8	9	60–70	50–60	-	-	-	71,5–73,6	7,9–9,1	
	-	Спектрал НОВИНКА	320	Зерно	Зуб.	8	7	8	8	8	9	60–70	55–60	-	+	-	72,1–74,7	7,9–8,4	
	-	СИ Топаз НОВИНКА	340	Зерно	Зуб.	8	8	8	8	9	9	60–70	55–60	-	+	+	70,0–73,9	8,1–8,9	
	-	СИ Артос НОВИНКА	370	Зерно	Зуб.	8	8	8	8	9	9	65–75	55–60	-	+	+	-	-	
ПОМІРНО-ІНТЕНСИВНИЙ		СИ Шикарі	200	Зерно	Зуб.	8	9	9	8	8	8	70–75	55–65	40–50	+	+	70,1–72,9	7,9–8,5	
	-	СИ Інвіктус	210	Зерно / крупа / силос / біогаз	Кр.-под.	8	9	8	8	9	8	70–75	60–70	45–60	+	-	71,0–73,3	7,7–8,1	
		СИ Феномен	220	Зерно	Зуб.	8	8	9	8	8	8	65–75	55–65	40–50	+	-	71,6–72,4	7,7–8,4	
		СИ Фрегат	250	Зерно	Зуб.	7	9	9	8	8	8	65–70	55–65	40–50	-	-	71,0–74,1	7,6–8,5	
	-	СИ Пандорас	250	Зерно / крупа / силос / біогаз	Кр.-под.	9	8	7	9	9	9	65–75	55–65	40–50	+	+	71,0–73,1	8,4–8,8	
		СИ Олівія НОВИНКА	260	Зерно	Зуб.	8	9	8	8	8	9	70–80	60–70	45–50	+	+	-	-	
	-	СИ Амфора	260	Силос, біогаз	Кр.-под.	8	7	7	9	8	9	75–80	70–75	-	-	-	-	-	
	-	СИ Фігура НОВИНКА	280	Зерно	Зуб.	8	8	9	8	9	9	70–80	60–70	45–50	+	+	-	-	
		СИ Чорінтос	290	Зерно	Зуб.	9	8	9	9	9	9	70–75	60–65	40–50	+	+	71,5–73,5	7,5–8,6	
	-	СИ Еленор НОВИНКА	300	Зерно	Зуб.	8	8	8	8	8	9	65–75	55–65	40–55	+	-	70,6–74,2	7,5–8,2	
	СИ Електрон НОВИНКА	320	Зерно	Зуб.	8	9	9	9	8	9	70–75	60–70	45–50	+	-	-	-		
ВИСОКОАДАПТИВНИЙ	-	СИ Амбадор	230	Зерно	Зуб.	8	8	9	8	8	9	65–75	55–65	40–55	+	+	70,3–73,7	7,5–8,5	
		СИ Фортаго	260	Зерно	Зуб.	7	9	9	9	8	8	65–70	60–65	40–50	+	+	70,6–73,2	8,7–9,6	
		СИ Скорпіус	290	Зерно	Зуб.	8	9	9	8	9	9	65–70	60–65	40–50	-	-	70,4–74,5	7,8–9,8	
		СИ Гранаріс	300	Зерно	Зуб.	8	9	9	8	8	9	70–75	60–70	40–50	+	+	71,5–74,6	8,0–9,8	



ШИКАРНА РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ РАНЬОГО ВРОЖАЮ

ГРУПА СТИГЛОСТІ	○ Середньоранній
ВИКОРИСТАННЯ	○ Зерно
ТИП ЗЕРНА	○ Зубоподібний
ТИП АДАПТИВНОСТІ	○ Помірно-інтенсивний

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ## ОЦІНКА ОЗНАК

СТІЙКІСТЬ

До сажкових хвороб ● ● ● ● ● ● ● ● ●

 Полісся
 Лісостеп
 Степ





ΦΑΟ ΖΙΟ

ГРУПА СТИГЛОСТІ	○ Середньоранній
ВИКОРИСТАННЯ	○ Крупа, зерно, силос, біогаз
ТИП ЗЕРНА	○ Кременистоподібний
ТИП АДАПТИВНОСТІ	○ Помірно-інтенсивний

- ✔ Достатнє зволоження — 70–75 тис./га
- ✔ Нестійке зволоження — 60–70 тис./га
- ✔ Недостатнє зволоження — 45–60 тис./га



- ✓ Високоврожайний скоростиглий гібрид, що дозволяє отримати ранній урожай зерна й поживного силосу для худоби
- ✓ Добра холодостійкість
- ✓ Раннє цвітіння і швидкий налив зерна

	Холодостійкість	
	Посухостійкість	
	Вологовіддача	
	Темп початкового росту	

До кореневих і стеблових гнилей ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

До сажкових хвороб ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●



СИ Феномен


ФАО 220

ВИСОКА ВРОЖАЙНІСТЬ
В УМОВАХ ПОСУХИ

- ГРУПА СТИГЛОСТІ
 - Середньоранній
- ВИКОРИСТАННЯ
 - Зерно
- ТИП ЗЕРНА
 - Зубоподібний
- ТИП АДАПТИВНОСТІ
 - Помірно-інтенсивний

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА РОСЛИН НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

- Достатнє зволоження — 65–75 тис./га
- Нестійке зволоження — 55–65 тис./га
- Недостатнє зволоження — 40–50 тис./га



- УРОЖАЙНІСТЬ (Ц/ГА) В ПЕРЕРАХУНКУ НА ВОЛОГІСТЬ ЗЕРНА 14 %, 2024 РІК
- ВОЛОГІСТЬ ЗЕРНА ПІД ЧАС ЗБИРАННЯ (%)

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ Високий потенціал урожайності
- ✓ Високий рівень посухостійкості, швидка вологовіддача зерна під час дозрівання
- ✓ Еректоїдне розташування листків

ОЦІНКА ОЗНАК

- Холодостійкість
- Посухостійкість
- Вологовіддача
- Темп початкового росту

СТІЙКІСТЬ

- До кореневих і стеблових гнилей
- До сажкових хвороб

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ

- Полісся
- Лісостеп
- Степ




ΦΑ0 230

НАДІЙНІСТЬ В УМОВАХ СТРЕСУ

ГРУПА СТИГЛОСТІ	○	Середньоранній
ВИКОРИСТАННЯ	○	Зерно
ТИП ЗЕРНА	○	Зубоподібний
ТИП АДАПТИВНОСТІ	○	Високоадаптивний

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА РОСЛИН НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

- ✔ Достатнє зволоження — 65–75 тис./га
- ✔ Нестійке зволоження — 55–65 тис./га
- ✔ Недостатнє зволоження — 40–55 тис./га



- УРОЖАЙНІСТЬ (Ц/ГА) В ПЕРЕРАХУНКУ НА ВОЛОГІСТЬ ЗЕРНА 14 %, 2024 РІК
- ВОЛОГІСТЬ ЗЕРНА ПІД ЧАС ЗБИРАННЯ (%)

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ Високий потенціал урожаю
- ✓ Придатний для вирощування в зонах нестійкого зволоження
- ✓ Швидка вологовіддача зерна в період дозрівання
- ✓ Стійкий до кореневого і стеблового вилягання

ОЦІНКА ОЗНАК

- [illegible]

СТІЙКІСТЬ

До коренових і стеблових гнилей

До сажкових хвороб ● ● ● ● ● ● ● ●

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ



Полісся



Лісостеп



Степ



ΦΑ0 250

ГРУПА СТИГЛОСТІ

- Середньоранній

ВИКОРИСТАННЯ

- Зерно

ТИП ЗЕРНА

- Зубоподібний

ТИП АДАПТИВНОСТІ

- Помірно-інтенсивний

- ✔ Достатнє зволоження — 65–70 тис./га
- ✔ Нестійке зволоження — 55–65 тис./га
- ✔ Недостатнє зволоження — 40–50 тис./га


- ✓ Високий потенціал урожаю
- ✓ Швидка вологовіддача зерна під час дозрівання
- ✓ Добра адаптованість до посушливих умов
- ✓ Висока стійкість до фузаріозу качана, висока якість зерна (експорт зерна)
- ✓ Вміст крохмалю в зерні становить 71,0–74,1 %

[illegible]

До кореневих і стеблових гнилей

До сажкових хвороб

 Полісся
 Лісостеп
 Степ



- УРОЖАЙНІСТЬ (Ц/ГА) В ПЕРЕРАХУНКУ НА ВОЛОГІСТЬ ЗЕРНА 14 %, 2024 РІК
- ВОЛОГІСТЬ ЗЕРНА ПІД ЧАС ЗБИРАННЯ (%)

ΦΑ0 250

ГРУПА СТИГЛОСТІ	○ Середньоранній
ВИКОРИСТАННЯ	○ Крупа, зерно, силос, біогаз
ТИП ЗЕРНА	○ Кременистоподібний
ТИП АДАПТИВНОСТІ	○ Помірно-інтенсивний

Region	Population in rural areas (%)	Population in rural areas (thousands of people)
Тернопільська обл., Тернопільський р-н	19,6 %	126,2
Київська обл., Обухівський р-н	16,4 %	113,5
Волинська обл., Ковельський р-н	22,4 %	113,4
Вінницька обл., Вінницький р-н	13,9 %	100,2
Львівська обл., Золочівський р-н	19,0 %	100,1
Черкаська обл., Черкаський р-н	15,0 %	99,3
Житомирська обл., Житомирський р-н	16,4 %	93,9
Сумська обл., Сумський р-н	12,0 %	85,1
Чернівецька обл., Ніжинський р-н	15,4 %	79,6
Кіровоградська обл., Кропивницький р-н	12,1 %	59,8
Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н	9,6 %	57,8

- 



СИ Олівія


ФАО 260

ВИСОКА ВРОЖАЙНІСТЬ
ТА АДАПТИВНІСТЬ

ГРУПА СТИГЛОСТІ	○ Середньоранній
ВИКОРИСТАННЯ	○ Зерно
ТИП ЗЕРНА	○ Зубоподібний
ТИП АДАПТИВНОСТІ	○ Помірно-інтенсивний

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА РОСЛИН НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

- ✓ Достатнє зволоження — 70–80 тис./га
- ✓ Нестійке зволоження — 60–70 тис./га
- ✓ Недостатнє зволоження — 45–50 тис./га



- УРОЖАЙНІСТЬ (Ц/ГА) В ПЕРЕРАХУНКУ НА ВОЛОГІСТЬ ЗЕРНА 14 %, 2024 РІК
- ВОЛОГІСТЬ ЗЕРНА ПІД ЧАС ЗБИРАННЯ (%)

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ Високий потенціал урожаю в оптимальних умовах
- ✓ Висока стабільність при нестійкому зволоженні
- ✓ Відмінне запилення та озерненість качана
- ✓ Міцне стебло, висока стійкість до вилягання
- ✓ Хороша вологовіддача в своїй групі стиглості

ОЦІНКА ОЗНАК

☼ Холодостійкість	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
☀ Посухостійкість	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
💧 Вологовіддача	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
✍ Темп початкового росту	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

СТІЙКІСТЬ

До коренових і стеблових гнилей	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
До сажкових хвороб	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ



Полісся



Лісостеп



Степ



СИ Олівія

ФАО 260

ВИСОКА ВРОЖАЙНІСТЬ ТА АДАПТИВНІСТЬ

Тип зерна
ЗУБОПОДІБНИЙ

Тип адаптивності
ПОМІРНО-ІНТЕНСИВНИЙ

Високий потенціал урожаю
в оптимальних умовах

Висока стабільність
при нестійкому зволоженні

Міцне стебло, висока
стійкість до вилягання

Хороша вологовіддача
в своїй групі стиглості



СИ Амфора

ФАО 260

ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ
І ВИСОКОЯКІСНИЙ СИЛОС

ГРУПА СТИГЛОСТІ

ВИКОРИСТАННЯ

ТИП ЗЕРНА

ТИП АДАПТИВНОСТІ

○ Середньоранній

○ Біогаз, силос

○ Кременистоподібний

○ Помірно-інтенсивний

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА РОСЛИН НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

- ✓ Достатнє зволоження — 75–80 тис./га
- ✓ Нестійке зволоження — 70–75 тис./га

Назва показника	Показники класу силосу «Преміум»	Дані господарства (Волинська область, Луцький район)
ADF, %	< 25	20,2
NDF, %	< 36	36
NEL (Чиста енергія лактації), Мдж	> 6,897	7,44
Крохмаль, %	< 36	42,3

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ Урожайність зеленої маси — 550–600 ц/га
- ✓ Вміст сухої речовини — 34–37 %
- ✓ Швидкий стартовий ріст
- ✓ Вміст у листостебловій масі:
 - крохмалю — 34,4–38,2 %
 - протеїну — 6,3–6,5 %
- ✓ Енергія лактації — 6,6–7,1 МДж/кг
- ✓ Перетравність листостеблової маси — 74,5–75,4 %

ОЦІНКА ОЗНАК

- ☀

Холодостійкість

●●●●●●●●●●
- ☀

Посухостійкість

●●●●●●●●●●
- 💧

Вологовіддача

●●●●●●●●●●
- ✂

Темп початкового росту

●●●●●●●●●●

СТІЙКІСТЬ

- До коренових і стеблових гнилей


●●●●●●●●●●
- До сажкових хвороб

●●●●●●●●●●

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ

- Полісся
- Лісостеп
- Степ

УРОЖАЙНІСТЬ ЗЕЛЕНОЇ МАСИ, Ц/ГА





СИ Фортаго


ФАО 260

СТАБІЛЬНА ВРОЖАЙНІСТЬ
І ВІДМІННА ПОСУХОСТІЙКІСТЬ

ГРУПА СТИГЛОСТІ	○ Середньоранній
ВИКОРИСТАННЯ	○ Зерно
ТИП ЗЕРНА	○ Зубоподібний
ТИП АДАПТИВНОСТІ	○ Високоадаптивний

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА РОСЛИН НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

- ✓ Достатнє зволоження — 65–70 тис./га
- ✓ Нестійке зволоження — 60–65 тис./га
- ✓ Недостатнє зволоження — 40–50 тис./га



- УРОЖАЙНІСТЬ (Ц/ГА) В ПЕРЕРАХУНКУ НА ВОЛОГІСТЬ ЗЕРНА 14 %, 2024 РІК
- ВОЛОГІСТЬ ЗЕРНА ПІД ЧАС ЗБИРАННЯ (%)

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ Гібрид високоврожайний і стабільний
- ✓ Швидкий ріст на початку вегетації
- ✓ Еректоїдний тип розміщення листків
- ✓ Стійкий до вилягання й основних хвороб кукурудзи
- ✓ Вміст білка в зерні становить 8,7–9,6 %

ОЦІНКА ОЗНАК

❄ Холодостійкість	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
☀ Посухостійкість	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
💧 Вологовіддача	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
✍ Темп початкового росту	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

СТІЙКІСТЬ

До кореневих і стеблових гнилей	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
До сажкових хвороб	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ



Полісся



Лісостеп



Степ

ΦΑ0 270

ГРУПА СТИГЛОСТІ	○	Середньоранній
ВИКОРИСТАННЯ	○	Зерно
ТИП ЗЕРНА	○	Зубоподібний
ТИП АДАПТИВНОСТІ	○	Інтенсивний

Region	Number of Enterprises	Share of Total Enterprises (%)
Тернопільська обл., Тернопільський р-н	170,2	17,2 %
Львівська обл., Золочівський р-н	152,8	19,0 %
Івано-Франківська обл., Коломийський р-н	147,4	16,4 %
Хмельницька обл., Камянець-Подільський р-н	138,1	14,3 %
Сумська обл., Конотопський р-н	131,2	14,3 %
Волинська обл., Володимир-Волинський р-н	119,4	16,9 %
Київська обл., Білоцерківський р-н	117,8	13,5 %
Вінницька обл., Вінницький р-н	116,2	18,6 %
Рівненська обл., Рівненський р-н	115,8	23,0 %
Черкаська обл., Черкаський р-н	106,6	15,3 %
Житомирська обл., Житомирський р-н	104,7	19,0 %
Чернігівська обл., Прилуцький р-н	86,1	15,6 %
Полтавська обл., Полтавський р-н	79,3	10,4 %
Кіровоградська обл., Голіванський р-н	67,1	11,2 %

- 82

**НОВИНКА**

ΦΑ0 280

ГРУПА СТИГЛОСТІ	○ Середньоранній
ВИКОРИСТАННЯ	○ Зерно
ТИП ЗЕРНА	○ Зубоподібний
ТИП АДАПТИВНОСТІ	○ Помірно-інтенсивний

- ✔ Достатнє зволоження — 70–80 тис./га
- ✔ Нестійке зволоження — 60–70 тис./га
- ✔ Недостатнє зволоження — 45–50 тис./га





ΦΑ0 290

ГРУПА СТИГЛОСТІ	○	Середньоранній
ВИКОРИСТАННЯ	○	Зерно
ТИП ЗЕРНА	○	Зубоподібний
ТИП АДАПТИВНОСТІ	○	Помірно-інтенсивний

- ✔ Достатнє зволоження — 70–75 тис./га
- ✔ Нестійке зволоження — 60–65 тис./га
- ✔ Недостатнє зволоження — 40–50 тис./га



- 84

- ✔ Гібрид здатний забезпечувати високу і стабільну врожайність у різних ґрунтово-кліматичних умовах
- ✔ Швидкий ріст на початку вегетації
- ✔ Швидка вологовіддача зерна під час дозрівання

[illegible]

До кореневих і стеблових гнилей

До сажкових хвороб



ВИСОКИЙ РІВЕНЬ УРОЖАЙНОСТІ ЗА СТРЕСОВИХ УМОВ

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА РОСЛИН НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

-
- | Region | Average number of employees per enterprise | Percentage of total |
|---|--|---------------------|
| Тернопільська обл., Тернопільський р-н | 153,0 | 21,8 % |
| Львівська обл., Золочівський р-н | 141,5 | 20,8 % |
| Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н | 136,6 | 17,1 % |
| Київська обл., Обухівський р-н | 129,1 | 16,3 % |
| Вінницька обл., Вінницький р-н | 121,1 | 17,4 % |
| Житомирська обл., Житомирський р-н | 106,0 | 16,5 % |
| Черкаська обл., Черкаський р-н | 101,6 | 15,5 % |
| Сумська обл., Сумський р-н | 86,1 | 11,2 % |
| Харківська обл., Богодухівський р-н | 70,5 | 13,2 % |
| Полтавська обл., Полтавський р-н | 69,8 | 11,1 % |
| Кіровоградська обл., Голованівський р-н | 65,7 | 12,1 % |

- ✓ Високоврожайний гібрид, який демонструє стабільну врожайність у різних ґрунтово-кліматичних умовах
- ✓ Швидка вологовіддача зерна під час дозрівання
- ✓ Добре адаптований для вирощування за посушливих умов
- ✓ Еректоїдний тип розміщення листків, підвищена ефективність фотосинтезу

[illegible]

До кореневих і стеблових гнилей

До сажкових хвороб

 Полісся
 Лісостеп
 Степ



ΦΑ0 300

ГРУПА СТИГЛОСТІ	○	Середньостиглий
ВИКОРИСТАННЯ	○	Зерно
ТИП ЗЕРНА	○	Зубоподібний
ТИП АДАПТИВНОСТІ	○	Високоадаптивний

Регіон	Відсоток населення, що працює в сільському господарстві
Тернопільська обл., Тернопільський р-н	164,2 22,0 %
Волинська обл., Ковельський р-н	163,0 18,6 %
Івано-Франківська обл., Коломийський р-н	155,5 15,7 %
Львівська обл., Львівський р-н	149,2 21,4 %
Вінницька обл., Хмельницький р-н	148,3 19,4 %
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н	132,5 18,2 %
Чернігівська обл., Ніжинський р-н	125,3 17,3 %
Рівненська обл., Рівненський р-н	123,9 22,4 %
Київська обл., Блоцерківський р-н	119,1 17,1 %
Сумська обл., Конотопський р-н	107,1 12,0 %
Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н	106,1 18,1 %
Черкаська обл., Черкаський р-н	97,5 14,0 %
Полтавська обл., Лувецький р-н	93,5 12,5 %
Харківська обл., Богодухівський р-н	87,4 14,1 %
Кіровоградська обл., Голованівський р-н	73,4 8,5 %
Дніпропетровська обл., Новомиковський р-н	73,2 13,0 %
Одеська обл., Пачулський р-н	52,2 13,6 %

- 86

 Полісся
 Лісостеп
 Степ



СИ Гранаріс **ФАО 300**

ЗАРЯДЖЕНИЙ НА ВРОЖАЙ

Тип зерна
ЗУБОПОДІБНИЙ

Тип адаптивності
ПОМІРНО-ІНТЕНСИВНИЙ





LIVE-фото

НОВИНКА

СИ Еленор


ФАО 300

ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ
В МІНЛИВИХ УМОВАХ

ГРУПА СТИГЛОСТІ	○ Середньостиглий
ВИКОРИСТАННЯ	○ Зерно
ТИП ЗЕРНА	○ Зубоподібний
ТИП АДАПТИВНОСТІ	○ Помірно-інтенсивний

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА РОСЛИН НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

- ✓ Достатнє зволоження — 65–75 тис./га
- ✓ Нестійке зволоження — 55–65 тис./га
- ✓ Недостатнє зволоження — 40–55 тис./га



- УРОЖАЙНІСТЬ (Ц/ГА) В ПЕРЕРАХУНКУ НА ВОЛОГІСТЬ ЗЕРНА 14 %, 2024 РІК
- ВОЛОГІСТЬ ЗЕРНА ПІД ЧАС ЗБИРАННЯ (%)

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ Високий потенціал урожаю
- ✓ Стійкий до повітряної та ґрунтової посухи
- ✓ Вміст білка в зерні — 7,5–8,2 %
- ✓ Вміст крохмалю — 70,6–74,2 %
- ✓ Рекомендовано збирати в оптимальні терміни
- ✓ Раннє цвітіння
- ✓ Швидкий налив зерна


ОЦІНКА ОЗНАК

☼ Холодостійкість	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
☀ Посухостійкість	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
💧 Вологовіддача	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
📏 Темп початкового росту	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

СТІЙКІСТЬ

До кореневих і стеблових гнилей	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
До сажкових хвороб	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ





ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ Високий потенціал урожаю
- ✓ Забезпечує добру окупність на інтенсивному фоні
- ✓ Завдяки міцному стеблу витримує помірні перестої
- ✓ Маса 1000 зерен — 212–250 г
- ✓ Вміст білка в зерні — 7,9–8,4 %
- ✓ Вміст крохмалю — 72,1–74,7 %

ОЦІНКА ОЗНАК

- ❄ Холодостійкість ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
- ☀ Посухостійкість ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
- 💧 Вологовіддача ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
- ✍ Темп початкового росту ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

СТІЙКІСТЬ

- До кореневих і стеблових гнилей ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
- До сажкових хвороб ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ

-  Полісся
-  Лісостеп

Спектрал


ФАО 320

НАДІЙНИЙ ПАРТНЕР В ІНТЕНСИВНИХ УМОВАХ


ГРУПА СТИГЛОСТІ	○ Середньостиглий
ВИКОРИСТАННЯ	○ Зерно
ТИП ЗЕРНА	○ Зубоподібний
ТИП АДАПТИВНОСТІ	○ Інтенсивний

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА РОСЛИН НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

- ✓ Достатнє зволоження — 60–70 тис./га
- ✓ Нестійке зволоження — 55–60 тис./га



- УРОЖАЙНІСТЬ (Ц/ГА) В ПЕРЕРАХУНКУ НА ВОЛОГІСТЬ ЗЕРНА 14 %, 2024 РІК
- ВОЛОГІСТЬ ЗЕРНА ПІД ЧАС ЗБИРАННЯ (%)



СИ Електрон

ΦΑ0 320

ГРУПА СТИГЛОСТІ

- Середньостиглий

ВИКОРИСТАННЯ

- Зерно

ТИП ЗЕРНА

- Зубоподібний

ТИП АДАПТИВНОСТІ

- Помірно-інтенсивний

- ✔ Достатнє зволоження — 70–75 тис./га
- ✔ Нестійке зволоження — 60–70 тис./га
- ✔ Недостатнє зволоження — 45–50 тис./га



- * Державна реєстрація цього гібрида та внесення його до Державного реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні, планується в грудні 2025 року.

- ✓ Високий потенціал урожаю
- ✓ Висока посухостійкість
- ✓ Адаптивний до різних умов вирощування
- ✓ Швидка вологовіддача зерна

[illegible]

До корневих і стеблових гнилей ● ● ● ● ● ● ● ● ●

До сажкових хвороб ● ● ● ● ● ● ● ● ●



СИ Електрон*

ФАО 320

ПЕРЕВИЩУЄ ОЧІКУВАННЯ

Тип зерна
ЗУБОПОДІБНИЙ

Тип адаптивності
ПОМІРНО-ІНТЕНСИВНИЙ

Високий
потенціал урожаю

Висока
посухостійкість

Адаптивний до різних
умов вирощування

Швидка
вологівіддача зерна

* Державна реєстрація цього гібрида та внесення його до Державного реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні, планується в грудні 2025 року.

syngenta

НОВИНКА

ΦΑ0 370

ГРУПА СТИГЛОСТІ	○ Середньостиглий
ВИКОРИСТАННЯ	○ Зерно
ТИП ЗЕРНА	○ Зубоподібний
ТИП АДАПТИВНОСТІ	○ Інтенсивний

- ✓ Достатнє зволоження — 65–75 тис./га
- ✓ Нестійке зволоження — 55–60 тис./га


- ✓ Високий потенціал урожаю
- ✓ Забезпечує добру окупність інтенсивних технологій
- ✓ Добре витримує помірний стрес
- ✓ Висока стійкість до основних хвороб
- ✓ Міцне стебло, здатне витримувати пізні збирання
- ✓ Придатний для вирощування на зрошенні

	Холодостійкість	
	Посухостійкість	
	Вологовіддача	
	Темп початкового росту	

До кореневих і стеблових гнилей

До сажкових хвороб

 Полісся
 Лісостеп
 Степ



- 

Препарати і строки їх застосування на кукурудзі

Проблеми при вирощуванні	Дозування												
		00	11	12	13	15	17/32	18/33	35	53	63	89	
Біологічна фіксація азоту та постачання його рослині	50 г/га						ВІКСЕРАН	NEW					
Ризиктоніоз, стимулювання розвитку кореневої системи	4 мл/1 п. о.												
Ризиктоніоз, стимулювання розвитку кореневої системи, летюча сажка	24 мл/1 п. о.												
Стеблові та кореневі гнилі, пліснявіння насіння і гельмінтоспоріоз	1,0 л/т												
Стеблові та кореневі гнилі, пліснявіння насіння	1,0 л/т												
Дротяники, несправжні дротяники, чорниші, шведські мухи, попелиці, білшки, західний кукурудзяний жук (діабротика)	6,0–9,0 л/т												
	5,0–6,0 л/т												
Однорічні злакові та дводольні бур'яни	2,5–3,5 л/га												
	4,0–4,5 л/га												
Однорічні злакові та дводольні бур'яни, деякі багаторічні дводольні бур'яни	3,5–4,0 л/га												
Однорічні й багаторічні дводольні бур'яни, в т. ч. осоти і падалиця соняшнику (ІМІ- та сульфостійка)	0,5; 0,7 л/га												
Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни	1,0–1,25 л/га												
Однорічні дводольні та деякі багаторічні дводольні бур'яни (у т. ч. стійкі до 2,4-Д і МЦПА), а також падалиця соняшнику й ріпаку	0,015–0,02 кг/га												
Однорічні й багаторічні злакові (у т. ч. сорго і пирій) та деякі однорічні дводольні бур'яни	1,0–1,25 л/га + ПАР*												
Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни	0,2–0,25 л/га + ПАР*												
Однорічні та багаторічні злакові й дводольні бур'яни (у т. ч. ваточник сирійський)	1,25–2,0 л/га												
Однорічні та багаторічні, злакові та дводольні бур'яни	1,0-1,33 л/га												
Західний кукурудзяний жук, ґрунтові шкідники	12,0–15,0 кг/га												
Дротяники	6,0–8,0 кг/га												
Стебловий кукурудзяний метелик, західний кукурудзяний жук	0,2–0,3 л/га												
Стебловий кукурудзяний метелик, попелиці	1,2–2,0 л/га												
Бавовникова совка і стебловий кукурудзяний метелик	0,2–0,3 л/га												
Стебловий кукурудзяний метелик	0,2 л/га												
Гельмінтоспоріозна й інші плямистості листя, іржа, фузаріоз, пухирчаста сажка	0,5–0,75 л/га												
Підвищення стійкості рослин до несприятливих умов	1,0–2,0 л/га												