



Каталог гібридів
**СОНЯШНИКУ
ТА КУКУРУДЗИ**

syngenta®

Розкриймо потенціал рослини разом®

ШАНОВНІ АГРАРІЇ, ПАРТНЕРИ, ДРУЗІ!

Наша спільна мета — зберегти і підвищити врожаї, полегшити працю і покращити добробут людей, які працюють на землі. Спільними зусиллями ми долаємо виклики й випробування, які постають перед нами, та неухильно рухаємося до цієї мети.

Компанія «Сингента» використовує унікальний світовий досвід, останні наукові розробки й досягнення в галузі біології, хімії, агрономії та високих технологій, щоб розкрити потенціал рослин і вивести сільське господарство на новий рівень.

Наші цінності — справедливість, чесність, добропорядність, сумлінність. На них ґрунтуються виробництво й бізнес-етика в компанії «Сингента». Разом з вами і завдяки вам ми відкриваємо нові обрії в сільському господарстві та вдосконалюємо наші продукцію й сервіси, щоб незмінно відповідати найвищим стандартам агробізнесу.

Щиро дякуємо вам за довіру, підтримку і міцне партнерство. Сподіваємося на дальшу плідну співпрацю з вами, яка принесе нові здобутки й перемоги.

*З повагою і найкращими побажаннями,
компанія «Сингента»*



Зміст

Зміст	5
Історія компанії.....	6
Elevation — захист насіння соняшнику та кукурудзи.....	8
Доповнена реальність у ваших смартфонах!	10

НАСІННЯ СОНЯШНИКУ 12

Що робить нас лідерами в селекції соняшнику.....	14
Історія селекції соняшнику в «Сингента»	15
Зведена таблиця характеристик гібридів соняшнику... 16	
Класичні гібриди	18
Особливості технології вирощування високоолеїнового соняшнику.....	26
Чинники, які впливають на вміст олеїнової кислоти.....	27
Високоолеїнові гібриди класичні	28
HTS-гібриди.....	30
Високоолеїнові HTS-гібриди.....	38
HTS-гібриди соняшнику компанії «Сингента» — запорука успіху	40
Clearfield® гібриди	41
Високоолеїнові Clearfield® гібриди.....	43
Високоолеїнові Clearfield® Plus гібриди.....	44
Гібриди соняшнику для виробничої системи Clearfield® та Clearfield® Plus.....	51
A.I.R.™ гібриди.....	52
A.I.R.™ — інноваційна технологія нових гібридів соняшнику.....	55
Препарати і строки їх застосування на соняшнику	62

НАСІННЯ КУКУРУДЗИ..... 64

Акція «З повним баком 2026» від «Сингента».....	66
Артезіан™	68
Портфоліо гібридів кукурудзи	70
Зведена таблиця характеристик гібридів кукурудзи	71
Портфоліо гібридів.....	72
Препарати і строки їх застосування на кукурудзі	94

СЕРВІСИ ТА ПОСЛУГИ 96

АгроГід.....	98
Як замовити сервіс	105
Cropwise Planting	106
Cropwise® Seed Selector.....	108
Продукти Syngenta Seedcare™	110
ФОРМУЛА М.....	113
Майстерня Агратія.....	114
Welcome to Syngenta Training Center!	115
Корпоративна соціальна відповідальність.....	116
Контактна інформація	120
Соціальні мережі.....	121
Нотатки.....	122

Історія компанії


«Сингента» у її сучасному вигляді — молода компанія, яку засновано на давній виробничій традиції, що нараховує більше як 250 років.

Ми пишаємося історією нашої компанії, яка вивела нас на позицію світового лідера




1876

Заснування
компанії «Сандоз»




1926

Заснування компанії
«Ай Сі Ай» у результаті
злиття компаній «Бруннер
Монд Лімітед», «Нобел
Індастріз», «Брітш
Дайстафс Коронейшн
Лімітед» і «Юнайтед Елкелі
Кампані Лімітед»



1953

Компанія «ППЛ»
(Плант Продакшн Лімітед)
переходить у повну
власність компанії «Ай
Сі Ай»



1974

Компанія
«Сіба-Гейгі»
розширює свій
бізнес на сферу
насіння завдяки
купівлі компанії
«Фанк Сідз
Інтернешнл»



1980

Компанія «Сандоз»
купує голландську групу
компаній «Заадуні»



1758

Заснування
компанії «Гейгі»



1884

Заснування
компанії «Сіба»




1937

Заснування компанії
«ППЛ» як спільного
підприємства компаній
«Ай Сі Ай» і «Купер
МалДугал енд Робертсон
Лімітед»



1970

Заснування
компанії «Сіба-
Гейгі» в результаті
злиття компаній
«Сіба» і «Гейгі»



1975

Компанія «Сандоз»
виходить на ринок
насіння, купивши
компанію «Роджерс»



ELEVATION — ЗАХИСТ НАСІННЯ СОНЯШНИКУ ТА КУКУРУДЗИ

Ефективний захист насіння запобігає ураженню збудниками хвороб і пошкодженню ґрунтовими та посходовими шкідниками, що дозволяє зберегти польову схожість й отримати рівномірні сходи, сприяє розвитку потужної кореневої системи і, відповідно, реалізації генетичного потенціалу гібридів. Очевидно, що продукти для захисту насіння забезпечують додаткову цінність самому насінню.

Наразі компанія «Сингента» пропонує дві ефективні комбінації протруювання насіння кукурудзи:



Та дві комбінації протруювання насіння соняшнику:



СПЕКТР ЕФЕКТИВНОСТІ

Elevation

- Ефективний контроль ґрунтової та насінневої інфекцій на початкових етапах розвитку
- Посилений захист від ґрунтових і посходових шкідників
- Зберігає оптимальну густоту здорових рослин

Elevation Plus

- Максимальний контроль ґрунтової та насінневої інфекцій
- Посилений захист від ґрунтових і посходових шкідників
- Підвищує стійкість сходів до несприятливих погодних чинників на ранньому етапі розвитку
- Покращує розвиток кореневої системи та рівномірність сходів

Спеціально розроблена формуляція, яка використовується в Elevation та Elevation Plus, забезпечує ефективність протягом щонайменше трьох років після обробки (протруювання) насіння.




Рис. 1. Залишковий вміст діючих речовин на обробленому насінні соняшнику за умови зберігання на сертифікованих складах.

Примітка: аналіз проводили на хроматографі з діодно-матричним детектором (HPLC DAD), який дозволяє точно відслідковувати залишковий вміст діючих речовин.

Продукти під брендами Elevation та Elevation Plus допомагають розкрити генетичний потенціал насіння та отримати високий урожай. Саме тому Elevation відіграє роль чинника росту: оброблене насіння забезпечує ріст урожайності та, відповідно, збільшення прибутку.

Доповнена реальність у ваших смартфонах!

Хочете побачити, як виглядає насіння гібрида соняшнику та виповненість кошика або яку форму качана і який тип зерна має обраний гібрид кукурудзи? Скористайтеся додатковою функцією перегляду фото, що «оживають» (Live-фото), й зробіть свій правильний вибір!

Live-фото — це фото гібридів соняшнику й кукурудзи на сторінках друкованого каталогу «Сингента», які відмічені характерною іконкою **► LIVE-фото** та «оживають» при наведенні на них камери через додаток AlbumAR, відтворюючи відео або анімацію.

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ:

Крок 1.



Проскануйте QR-код за допомогою камери вашого смартфона і завантажте додаток AlbumAR через App Store або Google Play.



Крок 2.

Повторно проскануйте QR-код, щоб завантажити медіабібліотеку до додатка AlbumAR.


Крок 3.

Відкрийте друкований каталог і знайдіть спеціальну позначку у вигляді іконки ►LIVE-фото на сторінці з гібридом. Потім відкрийте додаток AlbumAR і наведіть камеру через цей додаток на фото гібрида. На екрані з'явиться відео. Тримайте камеру над фото до завершення перегляду відео.

Додаткова інформація:

- Переконайтеся, що ваш смартфон підключено до Інтернету для першого завантаження додатка й медіабібліотеки.
- Завантаження медіабібліотеки потребує певного часу, тому дочекайтеся завершення процесу.
- Якщо у вас виникли проблеми, спробуйте перезавантажити додаток або оновити його до останньої версії.
- Шукайте спеціальну іконку на сторінках з гібридами по всьому каталозі. Звертаємо вашу увагу, що ця функція активована не для всіх гібридів.
- Якщо виникнуть запитання щодо використання додатка, звертайтеся до торгових представників «Сингента» у вашому регіоні.

Насолоджуйтеся можливістю такого перегляду нашого каталогу та дізнавайтеся більше про наші продукти!



НАСІННЯ СОНЯШНИКУ

Що робить нас лідерами в селекції соняшнику	14
Історія селекції соняшнику в «Сингента»	15
Зведена таблиця характеристик гібридів соняшнику	16

КЛАСИЧНІ ГІБРИДИ	18
СИ Честер	18
Алькантара	19
СИ Магістер	20
НК Конді	21
СИ Ласкала	22
СИ Теос	23
СИ Арізона	24
СИ Амазонія	25
Особливості технології вирощування високоолеїнового соняшнику	26
Чинники, які впливають на вміст олеїнової кислоти	27

ВИСОКООЛЕЇНОВІ ГІБРИДИ КЛАСИЧНІ	28
Тутті	28
СИ Феномено	29

HTS-ГІБРИДИ	30
Суомі	30
Сузука	31
Сунаріс	32
Суміко	33
Сурест	34
Сайберік	35
Сувора	36
Сурелі	37

ВИСОКООЛЕЇНОВІ HTS-ГІБРИДИ	38
Суліано	38
Субео	39
HTS-гібриди соняшнику компанії «Сингента» — запорука успіху	40

CLEARFIELD® ГІБРИДИ	41
СИ Барбаті	41
НК Неома	42

ВИСОКООЛЕЇНОВІ CLEARFIELD® ГІБРИДИ	43
СИ Експерто	43

ВИСОКООЛЕЇНОВІ CLEARFIELD® PLUS ГІБРИДИ	44
СИ Флавіо КЛП	44
СИ Дієго КЛП	45
СИ Розета КЛП	46
СИ Челсі КЛП	47
СИ Лазурі КЛП	48
СИ Бакарді КЛП	49
СИ Мічіган КЛП	50
Гібриди соняшнику для виробничої системи Clearfield® та Clearfield® Plus	51

A.I.R.™ ГІБРИДИ	52
СИ Іріса AP	52
СИ Корсіка AP	53
A.I.R.™ — інноваційна технологія нових гібридів соняшнику	55

Препарати і строки їх застосування на соняшнику	62
---	----



Що робить нас лідерами в селекції соняшнику

Завдяки селекційній програмі та роботі багатьох центрів з дослідження й розробки «Сингента» впроваджує у виробництво гібриди, які повністю відповідають певним умовам вирощування і виробничим завданням. Усі гібриди соняшнику перед комерційним використанням проходять всебічні багаторічні випробування й тестування в тих ґрунтово-кліматичних умовах, у яких їх надалі вирощуватимуть. Гібриди компанії «Сингента» характеризуються високою пластичністю і максимально реалізують свій потенціал за умови дотримання всіх технологічних вимог, як-от якісний обробіток ґрунту, захист від бур'янів, внесення добрив та ін.



СИЛЬНА ГЕНЕТИЧНА БАЗА

- Колекція диких видів
- Різноманітний генетичний матеріал
- Платформи для тестування на стійкість до хвороб



ЗНАННЯ СЕЛЕКЦІЇ

- Історія селекції соняшнику
- Використання платформ інших культур



РОЗВИТОК ПРОДУКТУ


- Передбачення напрямів розвитку ринку
- Створення гібридів з урахуванням потреб ринку



ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНІКИ

- Використання маркерної технології
- Селекція геному
- Створення гібридів з урахуванням потреб ринку

Історія селекції сояшнику в «Сингента»



Зведена таблиця характеристик гібридів соняшнику


ГІБРИД		ГРУПА СТИГЛОСТІ	ТИП АДАПТИВНОСТІ	СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА, РАСИ	ВМІСТ ОЛІЇ, %	ВИСОТА РОСЛИН	ТЕРМІН СІВБИ
КЛАСИЧНІ ГІБРИДИ							
СИ Честер		Ранньостиглий	Помірно-інтенсивний	A–G	52–54 %	Середня/висока	Ранні — пізні
Алькантара		Середньоранній	Екстенсивний	A–G	50–51 %	Середня/висока	Ранні — пізні
СИ Магістер		Середньоранній	Екстенсивний	A–G	50–52 %	Середня	Ранні — пізні
НК Конді		Середньостиглий	Інтенсивний	A–E	52–54 %	Середня/висока	Середні (оптимальні)
СИ Ласкала		Середньостиглий	Помірно-інтенсивний	A–G	50–52 %	Середня	Середні (оптимальні)
СИ Теос		Середньостиглий	Інтенсивний	A–G	51–53 %	Середня/висока	Середні (оптимальні)
СИ Арізона		Середньостиглий	Помірно-інтенсивний	A–G	52–54 %	Висока	Середні (оптимальні) — пізні
СИ Амазонія		Середньостиглий	Помірно-інтенсивний	A–G	52–54 %	Висока	Середні (оптимальні) — пізні
ВИСОКООЛІЙНОВІ ГІБРИДИ КЛАСИЧНІ							
Тутті		Середньостиглий	Інтенсивний	A–E	50–52 %	Середня/висока	Середні (оптимальні)
СИ Феномено		Середньостиглий	Помірно-інтенсивний	A–G	51–53 %	Середня/висока	Середні (оптимальні)
HTS-ГІБРИДИ							
Суомі		Ранньостиглий	Помірно-інтенсивний	A–G	50–52 %	Середня	Ранні — пізні
Сузука		Середньоранній	Екстенсивний	A–F	49–51 %	Середня/висока	Середні (оптимальні) — пізні
Сунаріс		Середньоранній	Екстенсивний	A–G	50–52 %	Середня	Ранні — пізні
Суміко		Середньоранній	Інтенсивний	A–E	53–55 %	Середня	Ранні — пізні
Сурест		Середньоранній	Інтенсивний	A–G	53–55 %	Середня	Ранні — пізні
Сайберік		Середньостиглий	Помірно-інтенсивний	A–G	50–52 %	Середня/висока	Середні (оптимальні)
Сувора		Середньостиглий	Помірно-інтенсивний	A–G	51–53 %	Висока	Середні (оптимальні)
Сурелі		Середньостиглий	Помірно-інтенсивний	A–G	52–54 %	Висока	Середні (оптимальні) — пізні
ВИСОКООЛІЙНОВІ HTS-ГІБРИДИ							
Суліано		Середньостиглий	Помірно-інтенсивний	A–G	50–52 %	Середня/висока	Середні (оптимальні)
Субео		Середньостиглий	Інтенсивний	A–G	51–53 %	Середня/висока	Середні (оптимальні)
ВИСОКООЛІЙНОВІ CLEARFIELD® ГІБРИДИ							
СИ Експерто		Середньостиглий	Інтенсивний	A–E	50–52 %	Середня/висока	Середні (оптимальні)
ВИСОКООЛІЙНОВІ CLEARFIELD® PLUS ГІБРИДИ							
СИ Флавіо КЛП		Середньоранній	Екстенсивний	A–G	51–53 %	Середня	Середні (оптимальні) — пізні
СИ Дієго КЛП		Середньостиглий	Помірно-інтенсивний	A–G	50–52 %	Середня/висока	Середні (оптимальні)
CLEARFIELD® ГІБРИДИ							
СИ Барбаті		Середньоранній	Екстенсивний	A–F	48–50 %	Середня/висока	Ранні — пізні
НК Неома		Середньостиглий	Інтенсивний	A–E	50–52 %	Низька/середня	Середні (оптимальні)
CLEARFIELD® PLUS ГІБРИДИ							
СИ Розета КЛП		Середньоранній	Екстенсивний	A–F	49–51 %	Середня	Середні (оптимальні) — пізні
СИ Челсі КЛП		Середньоранній	Екстенсивний	A–G	50–52 %	Середня	Ранні — пізні
СИ Лазурі КЛП		Середньоранній	Помірно-інтенсивний	A–G	51–53 %	Середня	Ранні — пізні
СИ Бакарді КЛП		Середньостиглий	Інтенсивний	A–E	50–52 %	Середня/висока	Середні (оптимальні)
СИ Мічіган КЛП		Середньостиглий	Помірно-інтенсивний	A–G	50–52 %	Висока	Середні (оптимальні) — пізні
A.I.R.™ ГІБРИДИ							
СИ Іріса AP		Середньоранній	Екстенсивний	A–G	49–51 %	Середня	Ранні — пізні
СИ Корсіка AP		Середньостиглий	Інтенсивний	A–G	51–53 %	Середня	Середні (оптимальні)

ГІБРИД		ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЙНОСТІ	ПОЧАТКОВИЙ РІСТ	СТАВІЛЬНІСТЬ	ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	КОМПЛЕКСНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ	ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ФІТОПШИСУ	ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО СКЛЕРОТІОЗУ	РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ	РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ		
										ДОСТАТНЄ ЗВОЛОЖЕННЯ	НЕСТІЙКЕ ЗВОЛОЖЕННЯ	НЕДОСТАТНЄ ЗВОЛОЖЕННЯ
КЛАСИЧНІ ГІБРИДИ												
СИ Честер	🌱 Solguard	7	7	8	8	7	7	8	Степ, Лісостеп, Полісся	50–55	45–50	35–40
Алькantara		8	9	8	9	7	7	8	Степ, Лісостеп (Південний)		40–50	35–40
СИ Магістер	🌱 Solguard	8	8	9	9	8	8	8	Степ, Лісостеп (Південний)		40–50	40–45
НК Конді		9	8	9	7	8	8	8	Лісостеп, Полісся	55–60	45–55	40–45
СИ Ласкала		9	8	9	8	8	8	8	Степ (Центральний та Північний), Лісостеп, Полісся	50–60	50–55	40–45
СИ Теос	🌱 Solguard	9	8	9	7	8	8	8	Степ (Північний та Центральний), Лісостеп, Полісся	50–55	50–55	40–45
СИ Арізона		9	8	9	8	8	8	8	Степ (Центральний та Північний), Лісостеп	50–55	45–50	35–45
СИ Амазонія	🌱 Solguard	9	8	9	8	8	8	8	Лісостеп, Степ (Північний та Центральний)	50–55	45–55	35–45
ВИСОКООЛІЙНОВІ ГІБРИДИ КЛАСИЧНІ												
Тутті		9	8	9	8	8	8	7	Лісостеп, Полісся	55–60	45–55	40–45
СИ Феномено		9	8	9	8	8	8	8	Лісостеп, Степ (Центральний і Північний)	50–55	45–55	35–45
HTS-ГІБРИДИ												
Суомі		8	8	8	7	8	8	8	Степ (Центральний та Північний), Лісостеп, Полісся	50–55	45–55	
Сузука		8	8	8	9	7	6	7	Степ		40–50	40–45
Сунаріс		8	8	9	8	8	7	7	Степ		40–50	40–45
Суміко		9	8	8	7	8	8	8	Степ (Північний), Лісостеп, Полісся	55–60	45–55	40–45
Сурест		8	8	9	8	8	8	8	Степ (Північний), Лісостеп, Полісся	55–60	45–55	40–45
Сайберік		9	8	9	8	8	8	8	Степ (Центральний та Північний), Лісостеп	50–55	45–55	35–45
Сувора		9	8	9	8	9	8	8	Степ (Північний), Лісостеп, Полісся	50–60	45–55	40–45
Сурелі		9	8	9	8	8	8	8	Степ (Центральний та Північний), Лісостеп	50–55	40–50	35–45
ВИСОКООЛІЙНОВІ HTS-ГІБРИДИ												
Суліано		9	8	9	8	8	8	8	Степ (Північний і Центральний), Лісостеп	50–60	45–55	40–45
Субео		9	8	9	8	8	8	7	Лісостеп, Степ (Північний)	55–60	45–55	40–45
ВИСОКООЛІЙНОВІ CLEARFIELD® ГІБРИДИ												
СИ Експерто	🌱 Solguard	9	8	9	8	8	8	8	Степ (Центральний та Північний), Лісостеп	55–60	45–55	40–45
ВИСОКООЛІЙНОВІ CLEARFIELD® PLUS ГІБРИДИ												
СИ Флавіо КЛП	🌱 Solguard	8	8	8	9	7	6	7	Степ		40–45	35–40
СИ Дієго КЛП	🌱 Solguard	9	8	9	8	8	8	8	Лісостеп, Степ (Північний і Центральний)	55–60	40–55	40–45
CLEARFIELD® ГІБРИДИ												
СИ Барбаті	🌱 Solguard	8	8	8	9	6	5	7	Степ		40–50	35–40
НК Неома	🌱 Solguard	9	8	8	7	8	8	8	Степ (Північний), Лісостеп, Полісся	50–60	50–55	40–45
CLEARFIELD® PLUS ГІБРИДИ												
СИ Розета КЛП	🌱 Solguard	8	8	8	9	7	6	7	Степ		40–50	35–45
СИ Челсі КЛП	🌱 Solguard	8	8	8	9	7	6	7	Степ		40–50	40–45
СИ Лазурі КЛП	🌱 Solguard	8	8	9	8	8	8	8	Степ (Північний і Центральний), Лісостеп, Полісся	50–55	45–55	40–45
СИ Бакарді КЛП	🌱 Solguard	9	8	9	7	8	8	8	Степ (Центральний та Північний), Лісостеп, Полісся	50–55	50–55	40–45
СИ Мічіган КЛП	🌱 Solguard	9	8	9	7	8	8	8	Степ (Центральний, Північний), Лісостеп	50–55	45–50	35–45
A.I.R.™ ГІБРИДИ												
СИ Іріса AP	🌱 Solguard	8	8	8	9	7	7	7	Степ		40–50	35–45
СИ Корсіка AP	🌱 Solguard	9	8	9	8	8	8	8	Степ (Північний), Лісостеп, Полісся	50–55	45–50	40–45



ГРУПА СТИГЛОСТІ	○ Ранньостиглий
ВИКОРИСТАННЯ	○ Лінолевий
НАПРЯМ ВИРОЩУВАННЯ	○ Класичний
ВМІСТ ОЛІЇ	○ 52–54 %
СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА	○ А–G
ТИП АДАПТИВНОСТІ	○ Помірно-інтенсивний
ВИСОТА РОСЛИНИ	○ Середня/висока, залежно від вологозабезпечення

- ☑ Достатнє зволоження — 50–55 тис. рослин/га
- ☑ Нестійке зволоження — 45–50 тис. рослин/га
- ☑ Недостатнє зволоження — 35–40 тис. рослин/га



18

- ✓ Пластичний до термінів посіву
- ✓ Добра запиленість кошика
- ✓ Адаптований до різних зон вирощування
- ✓ Висока та стабільна олійність і врожайність за посушливих умов

	Потенціал урожайності	
	Початкові темпи росту	
	Стабільність урожаю	
	Посухостійкість	
	Адаптивність до термінів посіву	

Ранні — пізні

Комплексна толерантність до хвороб	● ● ● ● ● ● ● ●
Толерантність до фомопсису	● ● ● ● ● ● ● ●
Толерантність до склеротиніозу	● ● ● ● ● ● ● ●


 Полісся
 Лісостеп
 Степ



**ПОСУШЛИВІСТЬ – АРЕНА,
А ВРОЖАЙНІСТЬ – ЯСКРАВИЙ ГРАВЕЦЬ**

ГРУПА СТИГЛОСТІ	○ Середньоранній
ВИКОРИСТАННЯ	○ Лінолевий
НАПРЯМ ВИРОЩУВАННЯ	○ Класичний
ВМІСТ ОЛІЇ	○ 50–51 %
СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА	○ А–G
ТИП АДАПТИВНОСТІ	○ Екстенсивний
ВИСОТА РОСЛИНИ	○ Середня/висока, залежно від вологозабезпечення

- ☑ Достатні зволоження — не рекомендується
- ☑ Нестійке зволоження — 40–50 тис. рослин/га
- ☑ Недостатні зволоження — 35–40 тис. рослин/га



УРОЖАЙНІСТЬ* ГІБРИДА В РІЗНИХ ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ, 2024 РІК * У перерахунку на вологість сім'янок 7 %, ц/га.

- ✓ Пластичний до термінів посіву
- ✓ Високий потенціал урожайності в посушливих умовах
- ✓ Висока жаростійкість
- ✓ Добра запиленість кошика в посушливих умовах

[illegible]

Комплексна толерантність до хвороб	●●●●●●●●●●
Толерантність до фомопсису	●●●●●●●●●●
Толерантність до склеротиніозу	●●●●●●●●●●

Лісостеп



Степ

**НОВИНКА**

МАЙСТЕР УРОЖАЮ

- Середня (залежно від вологозабезпечення)

Степ




НК Конді

ПАРТНЕРСТВО,
ВІДЗНАЧЕНЕ РЕКОРДАМИ

ГРУПА СТИГЛОСТІ	○ Середньостиглий
ВИКОРИСТАННЯ	○ Лінолевий
НАПРЯМ ВИРОЩУВАННЯ	○ Класичний
ВМІСТ ОЛІЇ	○ 52–54 %
СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА	○ А–Е
ТИП АДАПТИВНОСТІ	○ Інтенсивний
ВИСОТА РОСЛИНИ	○ Середня/висока, залежно від вологозабезпечення

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА (НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ)

- ✓ Достатнє зволоження — 55–60 тис. рослин/га
- ✓ Нестійке зволоження — 45–55 тис. рослин/га
- ✓ Недостатнє зволоження — 40–45 тис. рослин/га



УРОЖАЙНІСТЬ* ГІБРИДА В РІЗНИХ ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ, 2024 РІК * У перерахунку на вологість сім'янок 7 %, ц/га.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ Високий потенціал урожайності
- ✓ Найкраще розкриває потенціал на родючих ґрунтах
- ✓ Рекомендований для олієпереробних підприємств як один із найбільших високоврожайних гібридів з високим вмістом олії

ОЦІНКА ОЗНАК

Потенціал урожайності	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Початкові темпи росту	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Стабільність урожаю	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Посухостійкість	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Адаптивність до термінів посіву	Середні (оптимальні)

ТОЛЕРАНТНІСТЬ

Комплексна толерантність до хвороб	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Толерантність до фомопсису	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Толерантність до склеротиніозу	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ



ГАРМОНІЯ СТІЙКОСТІ ТА ВРОЖАЙНОСТІ

**РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА
(НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ)**

-
- | Region | Percentage (%) |
|--|----------------|
| Хмельницька обл., Шепетівський р-н | 43,1 |
| Вінницька обл., Немирівський р-н | 41,2 |
| Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н | 41,0 |
| Київська обл., Бородянський р-н | 40,3 |
| Тернопільська обл., Тернопільський р-н | 40,0 |
| Житомирська обл., Брусилавський р-н | 39,2 |
| Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н | 38,7 |
| Полтавська обл., Зіньківський р-н | 35,2 |
| Чернігівська обл., Бахмацький р-н | 34,3 |
| Кіровоградська обл., Онуфріївський р-н | 34,3 |
| Волинська обл., Ковельський р-н | 33,0 |
| Львівська обл., Золочівський р-н | 32,4 |
| Сумська обл., Краснопільський р-н | 31,5 |
| Харківська обл., Краснокутський р-н | 29,0 |

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ## ТОЛЕРАНТНІСТЬ

- РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ**

-  Полісся
  Лісостеп
  Степ



 Solguard

 LIVE-фото

СИ Теос

НАДІЙНИЙ ГРАВЕЦЬ НА ПОЛІ
ВИСОКИХ УРОЖАЇВ

ГРУПА СТИГЛОСТІ	○ Середньостиглий
ВИКОРИСТАННЯ	○ Лінолевий
НАПРЯМ ВИРОЩУВАННЯ	○ Класичний
ВМІСТ ОЛІЇ	○ 51–53 %
СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА	○ А–G
ТИП АДАПТИВНОСТІ	○ Інтенсивний
ВИСОТА РОСЛИНИ	○ Середня/висока, залежно від вологозабезпечення

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА (НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ)

- ✓ Достатнє зволоження — 50–55 тис. рослин/га
- ✓ Нестійке зволоження — 50–55 тис. рослин/га
- ✓ Недостатнє зволоження — 40–45 тис. рослин/га



УРОЖАЙНІСТЬ* ГІБРИДА В РІЗНИХ ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ, 2024 РІК

* У перерахунку на вологість сім'янок 7 %, ц/га.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ Добра запиленість кошика
- ✓ Стійкий до нових агресивних рас вовчка
- ✓ Стійкий до несправжньої борошнистої роси
- ✓ Найкраще розкриває потенціал за інтенсивної технології

ОЦІНКА ОЗНАК

 Потенціал урожайності	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 Початкові темпи росту	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 Стабільність урожаю	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 Посухостійкість	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 Адаптивність до термінів посіву	Середні (оптимальні)

ТОЛЕРАНТНІСТЬ

Комплексна толерантність до хвороб	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Толерантність до фомопсису	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Толерантність до склеротиніозу	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ



Полісся



Лісостеп



Степ

НАДІЙНІСТЬ, СТАБІЛЬНІСТЬ ТА ПЛАСТИЧНІСТЬ

- Висока, залежно від вологозабезпечення

* У перерахунку на вологість сім'янок 7 %, ц/га.



НОВІ ГОРИЗОНТИ СТІЙКОСТІ ДО ВОВЧКА

ГРУПА СТИГЛОСТІ	○ Середньостиглий
ВИКОРИСТАННЯ	○ Лінолевий
НАПРЯМ ВИРОЩУВАННЯ	○ Класичний
ВМІСТ ОЛІЇ	○ 52–54 %
СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА	○ А–G
ТИП АДАПТИВНОСТІ	○ Помірно-інтенсивний
ВИСОТА РОСЛИНИ	○ Висока, залежно від волого-забезпечення

- ☑ Достатнє зволоження — 50–55 тис. рослин/га
- ☑ Нестійке зволоження — 45–55 тис. рослин/га
- ☑ Недостатнє зволоження — 35–45 тис. рослин/га



УРОЖАЙНІСТЬ* ГІБРИДА В РІЗНИХ ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ, 2024 РІК

* У перерахунку на вологість сім'янок 7 %, ц/га.

- ✔ Добра запиленість кошика в стресових умовах
- ✔ Стійкий до стеблового вилягання
- ✔ Стійкий до несправжньої борошнистої роси
- ✔ Стійкий до нових агресивних рас вовчка

	Потенціал урожайності	
	Початкові темпи росту	
	Стабільність урожаю	
	Посухостійкість	
	Адаптивність до термінів посіву	

Середні (оптимальні)

[illegible]

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ



Лісостеп



Степ

ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ВИСОКООЛЕЇНОВОГО СОНЯШНИКУ

Загалом технологія вирощування загальноприйнята для соняшнику. Особливості її полягають у виконанні таких вимог: високоолеїнові гібриди рекомендується висівати в оптимальні терміни, коли ґрунт на глибині висіву прогріється до +12 °С; просторова ізоляція від класичного соняшнику має становити не менше ніж 200–400 м. Якщо немає можливості дотримуватися просторової ізоляції, то слід підбирати гібридний склад згідно з групами стиглості, щоб забезпечити цвітіння в різні терміни й уникнути переzapилення зі звичайним соняшником. Більшість високоолеїнових гібридів інтенсивні, тому при вирощуванні рекомендується дотримуватися збалансованої системи живлення, посів проводити в оптимальні терміни тощо.

Рекомендується також уникати вирощування високоолеїнового соняшнику в зонах із різко континентальним кліматом, адже різкі коливання нічних і денних температур під час цвітіння й наливу сім'янок можуть суттєво знизити рівень олеїнової кислоти в олії. Важливий чинник — підбір гібридів з генетично високим вмістом олеїнової кислоти і високою генетичною чистотою, що гарантує виробникам компанія «Сингента». При збиранні врожаю для контролю якості продукції рекомендується перевіряти вміст олеїнової кислоти на кожному полі й навіть з кожної машини. Це зведе до мінімуму змішування продукції при збиранні і транспортуванні.



ЧИННИКИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ВМІСТ ОЛЕЇНОВОЇ КИСЛОТИ



Генетика гібрида



Генетична чистота насіння



Нічна температура в період цвітіння й дозрівання насіння



Перезапилення із сусідніх полів



Фізичне змішування насіння:


- при посіві
- при збиранні
- при транспортуванні
- на складі
- під час сушіння
- при виробництві олії



ЧЕМПІОН ЗА ВРОЖАЙНІСТЮ СЕРЕД ВИСОКОЛЕЇНОВИХ ГІБРИДІВ

ГРУПА СТИГЛОСТІ	○ Середньостиглий
ВИКОРИСТАННЯ	○ Високоолеїновий
НАПРЯМ ВИРОЩУВАННЯ	○ Класичний
ОЛЕЇНОВА КИСЛОТА	○ До 93 %
ВМІСТ ОЛІЇ	○ 50–52 %
СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА	○ А–Е
ТИП АДАПТИВНОСТІ	○ Інтенсивний
ВИСОТА РОСЛИНИ	○ Середня/висока, залежно від вологозабезпечення

- ✔ Достатнє зволоження — 55–60 тис. рослин/га
- ✔ Нестійке зволоження — 45–55 тис. рослин/га
- ✔ Недостатнє зволоження — 40–45 тис. рослин/га



УРОЖАЙНІСТЬ* ГІБРИДА В РІЗНИХ ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ, 2024 РІК * У перерахунку на вологість сім'янок 7 %, ц/га.

- ✓ Лідер за рівнем урожайності та стабільності серед високоолеїнових гібридів
- ✓ Найкраща віддача при інтенсивній технології та родючих ґрунтах
- ✓ Висока компенсаційна здатність

	Потенціал урожайності	
	Початкові темпи росту	
	Стабільність урожаю	
	Посухостійкість	
	Адаптивність до термінів посіву	

Середні (оптимальні)


Комплексна толерантність до хвороб	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Толерантність до фомопсису	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Толерантність до склеротиніозу	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

 Полісся
 Лісостеп

УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ ДЛЯ РАНЬОГО ПРИБУТКУ

ГРУПА СТИГЛОСТІ	○ Ранньостиглий
ВИКОРИСТАННЯ	○ Лінолевий
НАПРЯМ ВИРОЩУВАННЯ	○ HTS
ВМІСТ ОЛІЇ	○ 50–52 %
СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА	○ A–G
ТИП АДАПТИВНОСТІ	○ Помірно-інтенсивний
ВИСОТА РОСЛИНИ	○ Середня, залежно від вологозабезпечення

- ☑ Достатнє зволоження — 50–55 тис. рослин/га
- ☑ Нестійке зволоження — 45–55 тис. рослин/га
- ☑ Недостатнє зволоження — 40–45 тис. рослин/га



* У перерахунку на вологість сім'янок 7 %, ц/га.

- ✓ Найраніший у HTS-сегменті
- ✓ Добра запиленість кошика
- ✓ Стійкий до несправжньої борошнистої роси
- ✓ Стійкий до вилягання
- ✓ Оптимізований до гербіцидів Флюенс® і Експрес™

	Потенціал урожайності	
	Початкові темпи росту	
	Стабільність урожаю	
	Посухостійкість	
	Адаптивність до термінів посіву	

Ранні — пізні

Комплексна толерантність до хвороб	● ● ● ● ● ● ● ●
Толерантність до фомопсису	● ● ● ● ● ● ● ●
Толерантність до склеротиніозу	● ● ● ● ● ● ● ●

 Полісся
 Лісостеп
 Степ




Сузука

НАДІЙНІСТЬ В УМОВАХ ПОСУХИ

ГРУПА СТИГЛОСТІ	○ Середньоранній
ВИКОРИСТАННЯ	○ Лінолевий
НАПРЯМ ВИРОЩУВАННЯ	○ HTS
ВМІСТ ОЛІЇ	○ 49–51 %
СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА	○ А–F
ТИП АДАПТИВНОСТІ	○ Екстенсивний
ВИСОТА РОСЛИНИ	○ Середня/висока, залежно від вологозабезпечення

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА (НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ)

- ✓ Достатнє зволоження — не рекомендується
- ✓ Нестійке зволоження — 40–50 тис. рослин/га
- ✓ Недостатнє зволоження — 40–45 тис. рослин/га



УРОЖАЙНІСТЬ* ГІБРИДА В РІЗНИХ ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ, 2024 РІК * У перерахунку на вологість сім'янок 7 %, ц/га.

Каталог гібридів соняшнику та кукурудзи • Насіння соняшнику

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ Швидкий розвиток на початку вегетації
- ✓ Висока жаростійкість
- ✓ Стабільна врожайність у посушливих умовах
- ✓ Оптимізований до гербіцидів Флюенс® і Експрес™

ОЦІНКА ОЗНАК

🌾 Потенціал урожайності	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
✏ Початкові темпи росту	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
🍷 Стабільність урожаю	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
☀ Посухостійкість	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
📅 Адаптивність до термінів посіву	Середні (оптимальні) — пізні

ТОЛЕРАНТНІСТЬ

Комплексна толерантність до хвороб	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Толерантність до фомопсису	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Толерантність до склеротиніозу	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ



Степ



Флюенс® і Експрес™ є зареєстрованою торговою маркою компанії FMC.





ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ Добра запиленість кошика
- ✓ Стійкий до іржі та несправжньої борошнистої роси
- ✓ Адаптований до стресових умов
- ✓ Пластичний до термінів посіву
- ✓ Оптимізований до гербіцидів Флюенс® і Експрес™

ОЦІНКА ОЗНАК

	Потенціал урожайності	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
	Початкові темпи росту	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
	Стабільність урожаю	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
	Посухостійкість	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
	Адаптивність до термінів посіву	Ранні — пізні

ТОЛЕРАНТНІСТЬ

Комплексна толерантність до хвороб	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Толерантність до фомопсису	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Толерантність до склеротиніозу	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ



Степ

Сунаріс

СТАБІЛЬНИЙ УРОЖАЙ
В ЕКСТЕНСИВНИХ УМОВАХ


► LIVE-фото

НОВИНКА

ГРУПА СТИГЛОСТІ	○ Середньоранній
ВИКОРИСТАННЯ	○ Лінолевий
НАПРЯМ ВИРОЩУВАННЯ	○ HTS
ВМІСТ ОЛІЇ	○ Високий (50–52 %)
СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА	○ А–G
ТИП АДАПТИВНОСТІ	○ Екстенсивний
ВИСОТА РОСЛИНИ	○ Середня (залежно від вологозабезпечення)

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА
(НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ)

- ✓ Достатнє зволоження — не рекомендується
- ✓ Нестійке зволоження — 40–50 тис. рослин/га
- ✓ Недостатнє зволоження — 40–45 тис. рослин/га




УРОЖАЙНІСТЬ* ГІБРИДА В РІЗНИХ ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ, 2024 РІК * У перерахунку на вологість сім'янок 7 %, ц/га.

ВИСОКИЙ ВМІСТ ОЛІЇ – НАШЕ ВИРАЖЕННЯ МАЙСТЕРНОСТІ

ГРУПА СТИГЛОСТІ	○ Середньоранній
ВИКОРИСТАННЯ	○ Лінолевий
НАПРЯМ ВИРОЩУВАННЯ	○ HTS
ВМІСТ ОЛІЇ	○ 53–55 %
СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА	○ А–Е
ТИП АДАПТИВНОСТІ	○ Інтенсивний
ВИСОТА РОСЛИНИ	○ Середня, залежно від вологозабезпечення

- ☑ Достатнє зволоження — 55–60 тис. рослин/га
- ☑ Нестійке зволоження — 45–55 тис. рослин/га
- ☑ Недостатнє зволоження — 40–45 тис. рослин/га



* У перерахунку на вологість сім'янок 7 %, ц/га.

- ✓ Рекордсмен з олійності
- ✓ Придатний до ранніх термінів сівби
- ✓ Стійкий до нових рас несправжньої борошнистої роси
- ✓ Стабільний урожай у різних ґрунтово-кліматичних зонах
- ✓ Оптимізований до гербіцидів Флюенс® і Експрес™

	Потенціал урожайності	
	Початкові темпи росту	
	Стабільність урожаю	
	Посухостійкість	
	Адаптивність до термінів посіву	

Ранні — пізні


Комплексна толерантність до хвороб	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Толерантність до фомопсису	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Толерантність до склеротиніозу	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

 Полісся
 Лісостеп
 Степ

НОВИЙ ПОГЛЯД НА ПРОДУКТИВНІСТЬ

ГРУПА СТИГЛОСТІ	○ Середньоранній
ВИКОРИСТАННЯ	○ Лінолевий
НАПРЯМ ВИРОЩУВАННЯ	○ HTS
ВМІСТ ОЛІЇ	○ 53–55 %
СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА	○ A–G
ТИП АДАПТИВНОСТІ	○ Інтенсивний
ВИСОТА РОСЛИНИ	○ Середня, залежно від вологозабезпечення

- ☑ Достатнє зволоження — 55–60 тис. рослин/га
- ☑ Нестійке зволоження — 45–55 тис. рослин/га
- ☑ Недостатнє зволоження — 40–45 тис. рослин/га




УРОЖАЙНІСТЬ* ГІБРИДА В РІЗНИХ ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ, 2024 РІК * У перерахунку на вологість сім'янок 7 %, ц/га.

- ✓ Високий потенціал урожайності
- ✓ Лідер з олійності
- ✓ Висока стійкість до несправжньої борошнистої роси
- ✓ Стійкість до стеблового вилягання
- ✓ Оптимізований до гербіцидів Флюенс® і Експрес™

[illegible]

Комплексна толерантність до хвороб	●●●●●●●●●●
Толерантність до фомопсису	●●●●●●●●●●
Толерантність до склеротиніозу	●●●●●●●●●●

 Полісся
 Лісостеп
 Степ



ГРУПА СТИГЛОСТІ	○ Середньостиглий
ВИКОРИСТАННЯ	○ Лінолевий
НАПРЯМ ВИРОЩУВАННЯ	○ HTS
ВМІСТ ОЛІЇ	○ 50–52 %
СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА	○ А–G
ТИП АДАПТИВНОСТІ	○ Помірно-інтенсивний
ВИСОТА РОСЛИНИ	○ Середня/висока, залежно від вологозабезпечення

ГАРАНТІЯ ПРИБУТКУ

НОВИНКА

* У перерахунку на вологість сім'янок 7 %, ц/га.

- ✔ Адаптований до різних ґрунтово-кліматичних умов вирощування
- ✔ Стійкий до стеблового вилягання
- ✔ Стійкий до несправжньої борошнистої роси та іржі
- ✔ Оптимізований до гербіцидів Флюенс® і Експрес™

	Потенціал урожайності	
	Початкові темпи росту	
	Стабільність урожаю	
	Посухостійкість	
	Адаптивність до термінів посіву	Середні (оптимальні)

Комплексна толерантність до хвороб	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Толерантність до фомопсису	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Толерантність до склеротиніозу	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ Високий потенціал урожайності
- ✓ Добра запиленість кошика, зокрема, в стресових умовах
- ✓ Стійкий до агресивних рас несправжньої борошнистої роси
- ✓ Оптимізований до гербіцидів Флюенс® і Експрес™

ОЦІНКА ОЗНАК

- 🌾 Потенціал урожайності ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
- 🌱 Початкові темпи росту ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
- 🌾 Стабільність урожаю ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
- ☀️ Посухостійкість ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
- 📅 Адаптивність до термінів посіву Середні (оптимальні)

ТОЛЕРАНТНІСТЬ

- Комплексна толерантність до хвороб ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
- Толерантність до фомопсису ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
- Толерантність до склеротиніозу ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ



Сурені


ГІБРИД, ЩО НАПОВНЮЄ ПОЛЕ
ПОТУЖНІСТЮ І РЕКОРДАМИ



- ГРУПА СТИГЛОСТІ ○ Середньостиглий
- ВИКОРИСТАННЯ ○ Лінолевий
- НАПРЯМ ВИРОЩУВАННЯ ○ HTS
- ВМІСТ ОЛІЇ ○ 52–54 %
- СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА ○ А–G
- ТИП АДАПТИВНОСТІ ○ Помірно-інтенсивний
- ВИСОТА РОСЛИНИ ○ Висока, залежно від волого-забезпечення

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА
(НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ)

- ✓ Достатнє зволоження — 50–55 тис. рослин/га
- ✓ Нестійке зволоження — 45–55 тис. рослин/га
- ✓ Недостатнє зволоження — 35–45 тис. рослин/га



УРОЖАЙНІСТЬ* ГІБРИДА В РІЗНИХ ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ, 2024 РІК * У перерахунку на вологість сім'янок 7 %, ц/га.




Флюенс® і Експрес™ є зареєстрованою торговою маркою компанії FMC.



▶ LIVE-ФОТО

ГРУПА СТИГЛОСТІ	○ Середньостиглий
ВИКОРИСТАННЯ	○ Високоолеїновий
НАПРЯМ ВИРОЩУВАННЯ	○ HTS
ОЛЕЇНОВА КИСЛОТА	○ До 86 %
ВМІСТ ОЛІЇ	○ 50–52 %
СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА	○ A–G
ТИП АДАПТИВНОСТІ	○ Помірно-інтенсивний
ВИСОТА РОСЛИНИ	○ Середня/висока, залежно від вологозабезпечення

- ☑ Достатнє зволоження — 55–60 тис. рослин/га
- ☑ Нестійке зволоження — 45–55 тис. рослин/га
- ☑ Недостатнє зволоження — 40–45 тис. рослин/га



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ Добра запиленість кошика, зокрема в стресових умовах
- ✓ Висока генетична стійкість до несправжньої борошнистої роси
- ✓ Стійкий до стеблового вилягання
- ✓ Адаптований до різних зон вирощування
- ✓ Оптимізований до гербіцидів Флюенс® і Експрес™

[illegible][illegible]

Полісся



Лісостеп



► LIVE-фото

Субео

НОВЕ МАЙБУТНЄ
У ВИСОКООЛЕЙНОВОМУ СЕГМЕНТІ

ГРУПА СТИГЛОСТІ	○ Середньостиглий
ВИКОРИСТАННЯ	○ Високоолеїновий
НАПРЯМ ВИРОЩУВАННЯ	○ HTS
ОЛЕЙНОВА КИСЛОТА	○ 87–89 %
ВМІСТ ОЛІЇ	○ 51–53 %
СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА	○ A–G
ТИП АДАПТИВНОСТІ	○ Інтенсивний
ВИСОТА РОСЛИНИ	○ Середня/висока, залежно від вологозабезпечення

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА (НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ)

- ✓ Достатнє зволоження — 55–60 тис. рослин/га
- ✓ Нестійке зволоження — 45–55 тис. рослин/га
- ✓ Недостатнє зволоження — 40–45 тис. рослин/га



УРОЖАЙНІСТЬ* ГІБРИДА В РІЗНИХ ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ, 2024 РІК * У перерахунку на вологість сім'янок 7 %, ц/га.

Каталог гібридів соняшнику та кукурудзи • Насіння соняшнику

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ Високий потенціал урожаю
- ✓ Стабільна врожайність у всіх зонах вирощування
- ✓ Стійкий до несправжньої борошнистої роси
- ✓ Джерело корисної олії
- ✓ Оптимізований до гербіцидів Флюенс® і Експрес™

ОЦІНКА ОЗНАК

🌾 Потенціал урожайності	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
✍ Початкові темпи росту	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
🌾 Стабільність урожаю	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
☀ Посухостійкість	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
📅 Адаптивність до термінів посіву	Середні (оптимальні)

ТОЛЕРАНТНІСТЬ

Комплексна толерантність до хвороб	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Толерантність до фомопсису	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Толерантність до склеротиніозу	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ



Лісостеп



Степ



Флюенс® і Експрес™ є зареєстрованою торговою маркою компанії FMC.



HTS-ГІБРИДИ СОНЯШНИКУ КОМПАНІЇ «СИНГЕНТА» — ЗАПОРУКА УСПІХУ

Завдяки інноваційним досягненням у селекції соняшнику «Сингента» є незаперечним лідером у виробництві високоякісного насіннєвого матеріалу. Гібриди компанії — визнаний еталон урожайності, технологічності та олійності у поєднанні з відмінною стійкістю до абіотичних і біотичних чинників у всіх напрямках використання, зокрема HTS-гібриди або сульфогібриди.

Асортимент HTS-гібридів (оптимізованих до гербіцидів Експрес™ та Флюенс®) соняшнику «Сингента» представлений гібридами різних груп стиглості, адаптивності та напрямів використання.

HTS-гібриди, що відзначаються високою генетичною стійкістю до нових рас несправжньої борошнистої роси (пероноспорозу): Суомі, Сунаріс, Суміко, Сурест, Сувора, Сурелі, Субео та Суліано.

Всі HTS-гібриди гомозиготні, що покращує стійкість до зазначених гербіцидів та дозволяє у разі потреби застосовувати повні їх норми.

Важливо при застосуванні цих гербіцидів дотримуватися рекомендацій компаній-виробників, а саме:

- не змішувати з грамініцидами (застосування протизлакових гербіцидів можливе за 4–7 днів до або через 6–9 днів після внесення);
- не застосовувати за температури вище ніж 25 °C;
- не використовувати під час значних коливань температури (більше ніж 15 °C між денними і нічними температурами);
- не застосовувати у період, коли соняшник знаходиться у стані стресу внаслідок складних погодних умов, заморозків, аномально жарких чи холодних, вологих або посушливих умов тощо.





**CLEARFIELD® ГІБРИД ДЛЯ ПОСУШЛИВИХ
УМОВ І НИЗЬКОГО АГРОФОНУ**

ГРУПА СТИГЛОСТІ	○ Середньоранній
ВИКОРИСТАННЯ	○ Лінолевий
НАПРЯМ ВИРОЩУВАННЯ	○ Clearfield®
ВМІСТ ОЛІЇ	○ 48–50 %
СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА	○ А–F
ТИП АДАПТИВНОСТІ	○ Екстенсивний
ВИСОТА РОСЛИНИ	○ Середня/висока, залежно від вологозабезпечення

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА (НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ)

- ☑ Достатне зволоження — не рекомендується
- ☑ Нестійке зволоження — 40–50 тис. рослин/га
- ☑ Недостатнє зволоження — 35–40 тис. рослин/га



УРОЖАЙНІСТЬ* ГІБРИДА В РІЗНИХ ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ, 2024 РІК * У перерахунку на вологість сім'янок 7 %, ц/га.



Унікальний знак Clearfield® є
зареєстрованою торговою маркою
компанії BASF.
© 2016 BASF. Усі права захищено.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ Витримує низький агрофон
- ✓ Відмінно розкриває потенціал у посушливих умовах
- ✓ Висока жаростійкість

ОЦІНКА ОЗНАК

- [illegible]

ТОЛЕРАНТНІСТЬ


- | | |
|------------------------------------|------------|
| Комплексна толерантність до хвороб | ●●●●●●●●●● |
| Толерантність до фомопсису | ●●●●●●●●●● |
| Толерантність до склеротиніозу | ●●●●●●●●●● |

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ



Степ





ГІБРИД, ПЕРЕВІРЕНИЙ ЧАСОМ

**РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА
(НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ)**

-
- | Region | Percentage (%) |
|--|----------------|
| Київська обл., Ірпінський р-н | 44,6 |
| Хмельницька обл., Шепетівський р-н | 42,6 |
| Черкаська обл., Куршун-Шевченківський р-н | 41,8 |
| Житомирська обл., Брусилівський р-н | 41,6 |
| Волинська обл., Ковельський р-н | 41,0 |
| Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н | 39,3 |
| Тернопільська обл., Тернопільський р-н | 38,9 |
| Полтавська обл., Чутівський р-н | 37,8 |
| Львівська обл., Золочівський р-н | 35,6 |
| Вінницька обл., Вінницький р-н | 35,4 |
| Чернігівська обл., Сосницький р-н | 35,4 |
| Харківська обл., Богодухівський р-н | 34,0 |
| Кіровоградська обл., Онуфріївський р-н | 32,3 |

УРОЖАЙНІСТЬ* ГІБРИДА В РІЗНИХ ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ, 2024 РІК * У перерахунку на вологість сім'янок 7 %, ц/га.

- ✓ Найкращу врожайність забезпечує на родючих ґрунтах
- ✓ Висока компенсаційна здатність
- ✓ Адаптивний і стабільний у різних умовах вирощування

	Потенціал урожайності	
	Початкові темпи росту	
	Стабільність урожаю	
	Посухостійкість	
	Адаптивність до термінів посіву	Середні (оптимальні)

Комплексна толерантність до хвороб	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Толерантність до фомопсису	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Толерантність до склеротиніозу	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

 Полісся
 Лісостеп
 Степ



**CLEARFIELD® ЕКСПЕРТ З ЦІННОЇ
ВИСОКООЛЕЇНОВОЇ ОЛІЇ**

- Середня/висока, залежно від вологозабезпечення

УРОЖАЙНІСТЬ* ГІБРИДА В РІЗНИХ ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ, 2024 РІК * У перерахунку на вологість сім'янок 7 %, ц/га.



Унікальний знак Clearfield® є
зареєстрованою торговою маркою
компанії BASF.
© 2016 BASF. Усі права захищено.

Каталог гібридів соняшнику та кукурудзи • Насіння соняшнику

- ✓ Найвищий потенціал урожайності у своєму сегменті
- ✓ Адаптований до різних умов вирощування
- ✓ Стійкий до несправжньої борошнистої роси

	Потенціал урожайності	
	Початкові темпи росту	
	Стабільність урожаю	
	Посухостійкість	
	Адаптивність до термінів посіву	

Середні — оптимальні

Комплексна толерантність до хвороб	●●●●●●●●●●
Толерантність до фомопсису	●●●●●●●●●●
Толерантність до склеротиніозу	●●●●●●●●●●

Лісостеп Степ



Лісостеп




Степ





ГРУПА СТИГЛОСТІ	○ Середньоранній
ВИКОРИСТАННЯ	○ Високоолеїновий
НАПРЯМ ВИРОЩУВАННЯ	○ Clearfield® Plus
ОЛЕїНОВА КИСЛОТА	○ До 88 %
ВМІСТ ОЛІЇ	○ 51–53 %
СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА	○ А–G
ТИП АДАПТИВНОСТІ	○ Екстенсивний
ВИСОТА РОСЛИНИ	○ Середня, залежно від вологозабезпечення

- ☑ Достатні зволоження — не рекомендується
- ☑ Нестійке зволоження — 40–50 тис. рослин/га
- ☑ Недостатні зволоження — 35–40 тис. рослин/га



УРОЖАЙНІСТЬ* ГІБРИДА В РІЗНИХ ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ, 2024 РІК * У перерахунку на вологість сім'янок 7 %, ц/га.

- ✓ Екстенсивний високоолеїновий Clearfield® Plus гібрид
- ✓ Висока початкова енергія росту
- ✓ Висока посухо- і жаростійкість
- ✓ Висока стійкість до несправжньої борошнистої роси
- ✓ Стабільні урожайність і вихід олії за посушливих умов

[illegible]

Комплексна толерантність до хвороб	● ● ● ● ● ● ● ●
Толерантність до фомопсису	● ● ● ● ● ● ● ●
Толерантність до склеротиніозу	● ● ● ● ● ● ● ●


Степ



ГАРАНТІЯ ВИСОКОГО ВРОЖАЮ ТА ОЛІЙНОСТІ

ГРУПА СТИГЛОСТІ	○ Середньостиглий
ВИКОРИСТАННЯ	○ Високоолеїновий
НАПРЯМ ВИРОЩУВАННЯ	○ Clearfield® Plus
ОЛЕЇНОВА КИСЛОТА	○ До 88 %
ВМІСТ ОЛІЇ	○ 50–52 %
СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА	○ А–G
ТИП АДАПТИВНОСТІ	○ Помірно-інтенсивний
ВИСОТА РОСЛИНИ	○ Середня/висока, залежно від вологозабезпечення

- ☑ Недостатнє зволоження — 40–45 тис. рослин/га
- ☑ Нестійке зволоження — 40–55 тис. рослин/га
- ☑ Достатнє зволоження — 55–60 тис. рослин/га



УРОЖАЙНІСТЬ* ГІБРИДА В РІЗНИХ ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ, 2024 РІК * У перерахунку на вологість сім'янок 7 %, ц/га.


- ✓ Придатний для регіонів з поширенням вовчка
- ✓ Стабільна врожайність
- ✓ Висока початкова енергія росту
- ✓ Стійкий до несправжньої борошнистої роси

	Потенціал урожайності	
	Початкові темпи росту	
	Стабільність урожаю	
	Посухостійкість	
	Адаптивність до термінів посіву	

Середні — оптимальні

Комплексна толерантність до хвороб	●●●●●●●●●●
Толерантність до фомопсису	●●●●●●●●●●
Толерантність до склеротиніозу	●●●●●●●●●●

Лісостеп Степ





ЧЕМПІОН ЗА ПОСУШЛИВИХ УМОВ

ГРУПА СТИГЛОСТІ	○ Середньоранній
ВИКОРИСТАННЯ	○ Лінолевий
НАПРЯМ ВИРОЩУВАННЯ	○ Clearfield® Plus
ВМІСТ ОЛІЇ	○ 49–51 %
СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА	○ А–F
ТИП АДАПТИВНОСТІ	○ Екстенсивний
ВИСОТА РОСЛИНИ	○ Середня, залежно від вологозабезпечення

УРОЖАЙНІСТЬ* ГІБРИДА В РІЗНИХ ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ, 2024 РІК * У перерахунку на вологість сім'янок 7 %, ц/га.



Унікальний знак Clearfield® Plus
є зареєстрованою торговою
маркою компанії BASF.
© 2016 BASF. Усі права захищено.

- ✓ Лідер з урожайності в стресових умовах
- ✓ Пластичний до термінів посіву
- ✓ Висока жаростійкість

[illegible]

Комплексна толерантність до хвороб	●●●●●●●●●●
Толерантність до фомопсису	●●●●●●●●●●
Толерантність до склеротиніозу	●●●●●●●●●●

Степ

 **Solguard**

▶ LIVE-ФОТО

НОВИНКА


СИ Чепсі КЛП

ЗАХИСТ ВАШОГО ВРОЖАЮ

ГРУПА СТИГЛОСТІ	○ Середньоранній
ВИКОРИСТАННЯ	○ Лінолевий
НАПРЯМ ВИРОЩУВАННЯ	○ Clearfield® Plus
ВМІСТ ОЛІЇ	○ 50–52 %
СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА	○ A–G
ТИП АДАПТИВНОСТІ	○ Екстенсивний
ВИСОТА РОСЛИНИ	○ Середня (175–185 см), залежно від вологозабезпечення

**РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА
(НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ)**

- ☑ Достатнє зволоження — не рекомендується
- ☑ Нестійке зволоження — 45–50 тис. рослин/га
- ☑ Недостатнє зволоження — 40–45 тис. рослин/га



УРОЖАЙНІСТЬ* ГІБРИДА В РІЗНИХ ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ, 2024 РІК * У перерахунку на вологість сім'янок 7 %, ц/га.

Каталог гібридів соняшнику та кукурудзи • Насіння соняшнику

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ Стабільний урожай у посушливих умовах
- ✓ Добра запиленість кошика
- ✓ Стійкий до несправжньої борошнистої роси
- ✓ Пластичний до термінів висіву

ОЦІНКА ОЗНАК

	Потенціал урожайності	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
	Початкові темпи росту	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
	Стабільність урожаю	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
	Посухостійкість	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
	Адаптивність до термінів посіву	

Ранні — пізні

ТОЛЕРАНТНІСТЬ

Комплексна толерантність до хвороб	●●●●●●●●●●
Толерантність до фомопсису	●●●●●●●●●●
Толерантність до склеротиніозу	●●●●●●●●●●

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ



Степ



Унікальний знак Clearfield® Plus
є зареєстрованою торговою
маркою компанії BASF.
© 2016 BASF. Усі права захищено.






ПОТУЖНИЙ УРОЖАЙ У КОЖНІЙ НАСІНИНІ

ГРУПА СТИГЛОСТІ	○ Середньоранній
ВИКОРИСТАННЯ	○ Лінолевий
НАПРЯМ ВИРОЩУВАННЯ	○ Clearfield® Plus
ВМІСТ ОЛІЇ	○ 51–53 %
СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА	○ A–G
ТИП АДАПТИВНОСТІ	○ Помірно-інтенсивний
ВИСОТА РОСЛИНИ	○ Середня, залежно від вологозабезпечення

- ☑ Достатнє зволоження — 50–55 тис. рослин/га
- ☑ Нестійке зволоження — 45–55 тис. рослин/га
- ☑ Недостатнє зволоження — 40–45 тис. рослин/га



УРОЖАЙНІСТЬ* ГІБРИДА В РІЗНИХ ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ, 2024 РІК * У перерахунку на вологість сім'янок 7 %, ц/га.

- ✓ Високий і стабільний урожай у ранньому й середньоранньому сегментах
- ✓ Високий вихід олії
- ✓ Добра запиленість кошика
- ✓ Стійкість до іржі

[illegible]

Комплексна толерантність до хвороб	●●●●●●●●●●
Толерантність до фомопсису	●●●●●●●●●●
Толерантність до склеротиніозу	●●●●●●●●●●



ГРУПА СТИГЛОСТІ	○ Середньостиглий
ВИКОРИСТАННЯ	○ Лінолевий
НАПРЯМ ВИРОЩУВАННЯ	○ Clearfield® Plus
ВМІСТ ОЛІЇ	○ 50–52 %
СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА	○ А–Е
ТИП АДАПТИВНОСТІ	○ Інтенсивний
ВИСОТА РОСЛИНИ	○ Середня/висока, залежно від вологозабезпечення

- ☑ Достатнє зволоження — 50–55 тис. рослин/га
- ☑ Нестійке зволоження — 50–55 тис. рослин/га
- ☑ Недостатнє зволоження — 40–45 тис. рослин/га



- ✔ Пластичний до вирощування в різних ґрунтово-кліматичних зонах
- ✔ Відмінно розкриває потенціал на родючих ґрунтах і при високому рівні агротехніки
- ✔ Висока пластичність і стабільна врожайність

	Потенціал урожайності	
	Початкові темпи росту	
	Стабільність урожаю	
	Посухостійкість	
	Адаптивність до термінів посіву	Середні (оптимальні)

Комплексна толерантність до хвороб	●●●●●●●●●●
Толерантність до фомопсису	●●●●●●●●●●
Толерантність до склеротиніозу	●●●●●●●●●●


Полісся



Лісостеп



Степ





ВІДМІННИК ВИСОКОГО ВРОЖАЮ ЗІ СТІЙКІСТЮ ДО ОСНОВНИХ ХВОРОБ

▶ LIVE-ФОТО

ГРУПА СТИГЛОСТІ	○ Середньостиглий
ВИКОРИСТАННЯ	○ Лінолевий
НАПРЯМ ВИРОЩУВАННЯ	○ Clearfield® Plus
ВМІСТ ОЛІЇ	○ 50–52 %
СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА	○ А–G
ТИП АДАПТИВНОСТІ	○ Помірно-інтенсивний
ВИСОТА РОСЛИНИ	○ Висока, залежно від волого-забезпечення

- ☑ Достатне зволоження — 50–55 тис. рослин/га
- ☑ Нестійке зволоження — 45–50 тис. рослин/га
- ☑ Недостатнє зволоження — 35–45 тис. рослин/га



Каталог гібридів соняшнику та кукурудзи • Насіння соняшнику

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✔ Стабільна врожайність
- ✔ Висока стійкість до агресивних рас несправжньої борошнистої роси
- ✔ Стійкий до стеблового вилягання

ОЦІНКА ОЗНАК

- | | | |
|---|---------------------------------|---|
|  | Потенціал урожайності |  |
|  | Початкові темпи росту |  |
|  | Стабільність урожаю |  |
|  | Посухостійкість |  |
|  | Адаптивність до термінів посіву |  |
- Середні (оптимальні) — пізні

ТОЛЕРАНТНІСТЬ

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| Комплексна толерантність до хвороб | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● |
| Толерантність до фомопсису | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● |
| Толерантність до склеротиніозу | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● |

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ



Лісостеп



Степ



Унікальний знак Clearfield® Plus
є зареєстрованою торговою
маркою компанії BASF.
© 2016 BASF. Усі права захищено.

ГІБРИДИ СОНЯШНИКУ ДЛЯ ВИРОБНИЧОЇ СИСТЕМИ CLEARFIELD® ТА CLEARFIELD® PLUS

Засміченість посівів соняшнику однодольними і дводольними видами бур'янів призводить до суттєвих втрат урожаю, а відтак до збитків. Особливо гостро ця проблема стоїть з такими видами бур'янів, як амброзія, нетреба, щириця та квітковим паразитом вовчком. Тому в останні роки спостерігається тенденція до вирощування гербіцидостійких гібридів соняшнику, зокрема Clearfield® або Clearfield® Plus.

Гібриди соняшнику, адаптовані для цих систем, отримано традиційним способом селекції без застосування генної інженерії.

Компанія «Сингента» має широкий набір гібридів для цих систем, які відзначаються врожайністю, стабільністю та олійністю.

Для виробничої системи Clearfield® це лінолеві СИ Барбаті та НК Неома, високоолеїновий СИ Експерто, а для Clearfield® Plus — лінолеві СИ Розета КЛП, СИ Челсі КЛП, СИ Лазурі КЛП, СИ Бакарді КЛП та СИ Мічіган КЛП, а високоолеїнові СИ Флавіо КЛП та СИ Дієго КЛП.

Отже, сільгоспвиробник може обрати гібрид для будь-якої зони вирощування, технології і на-пряму вирощування.


Для отримання максимальної ефективності та безпеки для культури при застосуванні гербіцидів, рекомендованих для цих систем, важливо дотримуватися рекомендацій компаній-виробників, а саме:

- препарати з групи імідазолінонів (такі д. р., як імазапір, імазамокс та ін.) не рекомендується використовувати на одному полі частіше ніж 1 раз на 3 роки;
- найкраща ефективність гербіцидів досягається за сприятливих для активної вегетації бур'янів температур і коли бур'яни знаходяться у чутливій фазі (дводольні у фазі 2–4 справжні листки, однодольні — 1–3 листки);
- не рекомендується застосовувати при середньодобових температурах нижче ніж +10 °C та вище за +25 °C;
- при перепаді нічних і денних температур більше ніж 15 °C;
- не використовувати в бакових сумішах з інсектицидами з групи ФОС.



ГРУПА СТИГЛОСТІ	○ Середньоранній
ВИКОРИСТАННЯ	○ Лінолевий
НАПРЯМ ВИРОЩУВАННЯ	○ A.I.R.™
ВМІСТ ОЛІЇ	○ 49–51 %
СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА	○ A–G
ТИП АДАПТИВНОСТІ	○ Екстенсивний
ВИСОТА РОСЛИНИ	○ Середня, залежно від вологозабезпечення

- ☑ Достатні зволоження — не рекомендується
- ☑ Нестійке зволоження — 45–50 тис. рослин/га
- ☑ Недостатні зволоження — 35–45 тис. рослин/га



* У перерахунку на вологість сім'янок 7 %, ц/га.

- ✓ Добра посухо- і жаростійкість
- ✓ Висока енергія початкового росту
- ✓ Стійкий до несправжньої борошнистої роси
- ✓ Стабільні врожайність і вихід олії за посушливих умов
- ✓ Гібрид СИ Іріса АР належить до унікальної технології A.I.R.™, що дозволяє використовувати гербіциди на основі імазамоксу / імазопіру або трибенурон-метилу. Це дає можливість ефективно контролювати бур'яни й вовчок у посівах соняшнику залежно від ситуації на полі

[illegible][illegible]

Степ



**МАКСИМАЛЬНИЙ УРОЖАЙ
З ІННОВАЦІЙНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ A.I.R.™**

ГРУПА СТИГЛОСТІ	○ Середньоранній
ВИКОРИСТАННЯ	○ Лінолевий
НАПРЯМ ВИРОЩУВАННЯ	○ A.I.R.™
ВМІСТ ОЛІЇ	○ 51–53 %
СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА	○ A–G
ТИП АДАПТИВНОСТІ	○ Інтенсивний
ВИСОТА РОСЛИНИ	○ Середня, залежно від вологозабезпечення

- ☑ Достатнє зволоження — 50–55 тис. рослин/га
- ☑ Нестійке зволоження — 45–50 тис. рослин/га
- ☑ Недостатнє зволоження — не рекомендується



- ✓ Висока генетична стійкість до несправжньої борошнистої роси
- ✓ Стійкий до стеблового вилягання
- ✓ Максимально розкриває потенціал за інтенсивної технології
- ✓ Гібрид СИ Корсіка АР належить до унікальної технології A.I.R.™, що дозволяє використовувати гербіциди на основі імазамоксу / імазапіру або трибенурон-метилу. Це дає можливість ефективно контролювати бур'яни й вовчок у посівах соняшнику залежно від ситуації на полі

[illegible][illegible]

 Полісся
 Лісостеп
 Степ (Північний)



Нова ера соняшнику. Зростай з A.I.R.TM

A.I.R.™ — ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ НОВИХ ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ

«Сингента» — світовий лідер у галузі насіння, ЗЗР та новітніх технологій. Компанія розуміє, що на ринку соняшнику, який невідпинно зростає і набирає дедалі більшого значення, існує чимало викликів. Один із головних серед них — контроль бур'янів і вовчка в посівах соняшнику, упоратися з ним сільгоспвиробникам непросто. Традиційні системи захисту не вирішують повною мірою всіх проблем, а в період можливого застосування післясходових гербіцидів немає достатньої гнучкості для цього. Тож бур'яни й далі негативно впливають на врожайність і якість урожаю.

«Сингента» пропонує інноваційну технологію A.I.R.™, що допомагає сільгоспвиробникам у всій Європі успішно контролювати бур'яни і вовчок у посівах соняшнику, толерантного до гербіцидів.

Селекціонери компанії «Сингента» створили гібриди нового покоління, а технологія A.I.R.™ має потенціал для трансформації ринку соняшнику у Європі. Ця технологія забезпечить необхідну гнучкість для застосування гербіцидів на основі трибенурон-метилу й імазамоксу / імазапіру, як-от Clearfield®, Clearfield® Plus, а також ExpressSun®*. Технологія A.I.R.™ розширює можливості та поєднує найкращі властивості гібридів соняшнику і захист посівів від бур'янів, забезпечуючи при цьому вищий рівень гнучкості та більше переваг, ніж будь-яка інша з наявних сьогодні систем захисту.

* Тільки гербіциди, рекомендовані для гібридів A.I.R.™

Рекомендовані гербіциди для гібридів A.I.R.™

Ґрунтові гербіциди:

-  Примекстра®TZ
Голг
-  Дуал Голг®
+
 Гезагард®

Продукти на основі імазамоксу:

-  Такомир®
-  Каптора®
-  Каптора® Плюс

Продукти на основі трибенурон-метилу:

-  Флюенс®
+ ПАР Тренд®

Вибір гербіциду для гібридів A.I.R.[™]: посіви без вовчка соняшникового

Домінантні види бур'янів	Стадія розвитку бур'яну	Стадія розвитку культури (ВВСН)	Гербіцид	Норма внесення, л/га	Коментарі
Хрестоцвіті, лобода (види), гірчак березкоподібний*	2–4 листки	12–14	 Флюенс [®] (трибенурон-метил 75) + ПАР Тренд [®]	0,03 кг/га + ПАР 2–4 листки бур'янів 0,05 кг/га + ПАР перерослі бур'яни	Ранні посіви соняшнику
або					
Амброзія (види), нетреба звичайна, дурман звичайний, канатник Теофраста, лобода (види)**	2–4 листки	12–14	 Такомир [®]	1,0–1,5	У разі однорічних дводольних бур'янів
або					
Амброзія (види), нетреба звичайна, дурман звичайний, канатник Теофраста, лобода (види)** Багаторічні дводольні, злакові бур'яни**	2–6 листків	12–14	 Каптора [®]  Каптора [®] Плюс	1,0–1,2 / 1,6–2,5	У разі перерослої лободи краще застосовувати Каптора [®] Плюс

* Контроль злакових бур'янів можливий Фюзілад[®] Форте або іншими ФОП у друге внесення (ВВСН 14–18 соняшнику).

** У разі сильної засміченості амброзією й нетребою доречно використовувати комбіновану систему захисту із застосуванням ґрунтових гербіцидів. **Ґрунтове внесення:** Примекстра[®] TZ Голд, 4,5 л/га або Дуал Голд[®], 1,6 л/га + Гезагард[®], 2,5–3,0 л/га.
Післясходове внесення: Такомир[®], Каптора[®] або Каптора[®] Плюс у 4–6 (8) листків соняшнику.

Вибір гербіциду для гібридів A.I.R.[™]: посіви з невисокою засміченістю вовчком та без амброзії

ОПЦІЯ 1

Оптимальна стадія розвитку бур'янів:

- Дводольні — 2–4 листки
- Злакові — 1–3 листки



Вибір гербіциду для гібридів A.I.R.[™]: посіви з високою засміченістю вовчком та низькою засміченістю амброзією

ОПЦІЯ 2

Немає амброзії у ВВСН 12–14 соняшнику (вона може з'явитися пізніше)

Оптимальна стадія розвитку бур'янів:

- Дводольні — 2–4 листки
- Злакові — 1–3 листки




Вибір гербіциду для гібридів A.I.R.[™]: посіви з високою засміченістю вовчком та амброзією

ОПЦІЯ 3

Оптимальна стадія розвитку бур'янів:

- Дводольні — 2–4 листки
- Злакові — 1–3 листки



Рекомендації з контролю падалиці A.I.R.™ у сівозміні

Зернові колосові культури:

Пріма™ ФОРТЕ
ГЕРБІЦИД



Лонтрел™ ГРАНД
ГЕРБІЦИД

У разі появи падалиці після фази трубкування зернових: д. р. — флуроксипір, МЦПА

Кукурудза:



Цукрові буряки:

Лонтрел™ ГРАНД
ГЕРБІЦИД

Ріпак:

Лонтрел™ ГРАНД
ГЕРБІЦИД

або гербіциди на основі клопіраліду й амінопіраліду

Горох: гербіциди на основі МЦПА

Також можна застосувати гліфосат перед посівом
або після збирання там, де це регламентовано.



Препарати і строки їх застосування на соняшнику

Проблеми при вирощуванні	Дозування												
Біологічна фіксація азоту та постачання його рослині	50 г/га												
Несправжня борошниста роса, вертицильоз, біла гниль	3,0 л/т	АПРОН XL											
Кореневі гнилі	5,0–6,0 л/т	МАКСИМ 025											
Дротяники, несправжні дротяники, сірий і південний бурякові довгоносики, мідляки, попелиці, павутинні кліщі	6,0–10,0 л/т	КРУІЗЕР 350											
Комплекс ґрунтових шкідників	4,0–6,0 л/т	ФОРС											
Однорічні і багаторічні злакові та дводольні бур'яни	2,0–4,0 л/га	УРАГАН ФОРТЕ											
Однорічні злакові й окремі дводольні бур'яни	1,6 л/га	ДУАЛ ГОЛД											
Однорічні дводольні та деякі злакові бур'яни	2,0–4,0 л/га	ГЕЗАГАРД											
Однорічні злакові і дводольні бур'яни	4,5 л/га	ПРИМЕКСТРА TZ ГОЛД											
Однорічні злакові та дводольні бур'яни	0,9–1,5 л/га												
Однорічні дводольні бур'яни	30–50 г/га + ПАР Тренд®												
Злакові і дводольні бур'яни	1,0–1,2 л/га												
Злакові і дводольні бур'яни	1,6–2,5 л/га												
Однорічні і багаторічні злакові бур'яни	0,5–2,0 л/га												
Сіра гниль	0,75 кг/га												
Фомоз, альтернаріоз, септоріоз, фомопсис, іржа, несправжня борошниста роса	0,75–1,0 л/га												
Альтернаріоз, фомоз, іржа, септоріоз, фомопсис, біла гниль	0,5–1,0 л/га												
Септоріоз, фомоз, альтернаріоз, іржа	0,3–0,5 л/га												
Септоріоз, альтернаріоз, фомоз, фомопсис, іржа, біла гниль	0,5–1,0 л/га												
Септоріоз, фомоз, альтернаріоз, іржа	0,4–0,6 л/га												
Фомоз, септоріоз, альтернаріоз, регуляція ростових процесів	0,3–0,5 л/га												
Комплекс ґрунтових шкідників	6,0–8,0 кг/га	ФОРС 1,5 G											
Довгоносики, мідляки, соняшникова шипоноска	0,1–0,15 л/га												
Геліхризова попелиця, соняшникова шипоноска	0,18 л/га												
Бавовникова совка, лучний метелик	0,2–0,3 л/га												
Павутинні кліщі	0,75–0,9 л/га												
Десикація	1,0–2,25 л/га												РЕГЛОН ЕЙР
	2,0–3,0 л/га												РЕГЛОН СУПЕР
	1,5–2,25 л/га												РЕГЛОН ФОРТЕ
	2,0–4,0 л/га												УРАГАН ФОРТЕ
Підвищення стійкості рослин до несприятливих умов	1,0–2,0 л/га												

ПРОТРУЙНИК

ГЕРБІЦИД

ІНСЕКТИЦИД

ФУНГЦИД

РЕТАРДАНТ

БІОСТИМУЛЯТОР

* На гібридах соняшнику, стійких до гербіциду Каптора®.

** На гібридах соняшнику, стійких до гербіциду Каптора® Плюс.

*** На гібридах соняшнику, стійких до трибенурон-метилу, а також на A.I.R.™ гібридах.

**** На гібридах, стійких до імідазоліонів, та на A.I.R.™ гібридах.



 **Elevation**Plus

МАКСИМАЛЬНЕ
РОЗКРИТТЯ

ГЕНЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
НАСІННЯ



 **Elevation**

ОПТИМАЛЬНЕ
ПОЄДНАННЯ
ДЛЯ ЗАХИСТУ НАСІННЯ

syngenta®

НАСІННЯ КУКУРУДЗИ

Акція «З повним баком 2026» від «Сингента»	66
Артезіан™	68
Зведена таблиця характеристик гібридів кукурудзи	71
СИ Шикарі ФАО 200	72
СИ Інвіктус ФАО 210	73
СИ Феномен ФАО 220	74
СИ Амбатор ФАО 230	75
СИ Фрегат ФАО 250	76
СИ Пандорас ФАО 250	77
СИ Олівія ФАО 260	78
СИ Амфора ФАО 260	80
СИ Фортаго ФАО 260	81
СИ Памплони ФАО 270	82
СИ Фігура ФАО 280	83
СИ Чорінтос ФАО 290	84
СИ Скорпіус ФАО 290	85
СИ Гранаріс ФАО 300	86
СИ Еленор ФАО 300	88
Спектрал ФАО 320	89
СИ Електрон ФАО 320	90
СИ Топаз ФАО 340	92
СИ Артос ФАО 370	93
Препарати і строки їх застосування на кукурудзі	94



Акція «З повним баком 2026» від «Сингента»

Новинки кукурудзи заправляють до повного!

Купуйте новинки гібридів кукурудзи та отримуйте гривневий сертифікат на заправку будь-яким видом пального на АЗК «ОККО».

1 п. о. Акційної продукції = 230 грн

ГІБРИДИ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ В АКЦІЇ:

СИ Олівія (ФАО 260) НОВИНКА

Спектрал (ФАО 320) НОВИНКА

СИ Фігура* (ФАО 280) НОВИНКА

СИ Електрон* (ФАО 320) НОВИНКА

СИ Еленор (ФАО 300) НОВИНКА

СИ Топаз (ФАО 340) НОВИНКА

СИ Гранаріс (ФАО 300)

СИ Артос (ФАО 370) НОВИНКА

ЗРОБІТЬ ЧОТИРИ ПРОСТІ КРОКИ Й ОТРИМАЙТЕ ВИГОДУ:

- ✓ **Крок 1:** Підпишіть ваучер програми «Агропартнер» компанії «Сингента» на придбання Акційної продукції** до 15.11.2025 в офіційних дистриб'юторів та субдистриб'юторів.
- ✓ **Крок 2:** Придбайте у сезоні 2025–2026 не меншу кількість п. о. гібридів кукурудзи (Акційна продукція та/або інші гібриди кукурудзи разом), ніж було придбано в сезоні 2024–2025.
- ✓ **Крок 3:** Надайте Організатору скани підписаних видаткових накладних на придбання Акційної продукції в сезоні 2025–2026.
- ✓ **Крок 4:** Передайте Організатору оригінал підписаного уповноваженою особою Учасника Акта приймання-передачі.

Виконання цих кроків гарантує отримання Винагороди*** 230 грн за кожну придбану п. о. Акційної продукції з переліку, наведеного вище.

Гривневий сертифікат із зазначеною загальною сумою Винагороди на заправку будь-яким наявним видом пального на АЗК «ОККО» надається представниками «Сингента».

ВАЖЛИВО:

- Акційна пропозиція обмежена.
- Пропозиція діє при купівлі в офіційних дистриб'юторів та субдистриб'юторів.
- Винагорода нараховується і надається тільки після виконання всіх кроків, зазначених вище.

Не втрачайте можливість отримати додаткові бонуси — приєднуйтеся до Акції вже сьогодні!

АКЦІЯ ДІЄ З 01.09.2025 РОКУ ПО 29.05.2026 РОКУ.

За детальною інформацією звертайтеся до представників компанії «Сингента» або за QR-кодом.

* Державна реєстрація цього гібрида та внесення його до Державного реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні, планується в грудні 2025 року. Цей гібрид буде доступний до продажу лише після державної реєстрації.

** Акційна продукція — насіння гібридів кукурудзи компанії «Сингента», що беруть участь в Акції.

*** Винагорода — сертифікат багаторазового використання, який надає право його пред'явнику на отримання знижки від існуючих цін у розмірі, вказаному в Сертифікаті, на будь-який наявний у мережі АЗК «ОККО» вид пального.



АКЦІЯ

Купуйте новинки гібридів кукурудзи та отримуйте гривневий сертифікат на заправку будь-яким видом пального на АЗК «ОККО». 1 п. о. = 230 грн на пальне.

З ПОВНИМ БАКОМ 2026

Новинки кукурудзи
заправляють
до повного



= 230 грн



Гібриди, що беруть участь в Акції:

НОВИНКА СИ Олівія (ФАО 260)

СИ Гранаріс (ФАО 300)

НОВИНКА СИ Топаз (ФАО 340)

НОВИНКА СИ Фігура* (ФАО 280)

НОВИНКА СИ Спектрал (ФАО 320)

НОВИНКА СИ Артос (ФАО 370)

НОВИНКА СИ Еленор (ФАО 300)

НОВИНКА СИ Електрон* (ФАО 320)



Акція діє з 01.09.2025 по 29.05.2026.

Акційна пропозиція обмежена.

* Державна реєстрація цього гібрида та внесення його до Державного реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні, планується в грудні 2025 року.

syngenta.



Артезіан™ — це бренд інноваційних гібридів кукурудзи від Syngenta, що характеризуються підвищеною ефективністю використання води та генотипи яких забезпечують збереження закладеного врожаю протягом усього сезону. Ці гібриди є результатом програм, присвячених вивченню та оптимізації водоспоживання рослин, що поєднує найсучасніші технології селекції.

Гібриди Артезіан™ повністю забезпечують фермерам можливість досягти виробничих цілей завдяки вищій ефективності перетворення вологи на зерно


У наукових лабораторіях аналізують геноми кукурудзи Артезіан™ і виявляють гени, які підвищують здатність витримувати несприятливі умови

За несприятливих умов такі генотипи здатні посилювати експресію гормонів, що активують механізми пристосування до несприятливих умов

Нормальний перебіг фізіологічних процесів у рослині підтримується протягом довшого періоду після настання стресової дії посухи

Визнанню кожного нового гібрида кукурудзи придатним для вирощування в Україні передують титанічна праця науковців з вивчення його адаптивності до кліматичних особливостей різних зон, пов'язаних головню з фотоперіодичною реакцією, скоростиглістю, холодостійкістю, стійкістю до посухи.

Завдяки великим успіхам у створенні гібридів кукурудзи Артезіан™, адаптованих до стресових чинників, сьогодні компанія «Сингента» пропонує ефективний шлях підвищення рівня урожайності і рентабельності вирощування цієї культури.



Портфоліо гібридів кукурудзи

ТИП АДАПТИВСТІ	АРТЕЗІАН™	ГІБРИД	ФАО	НОВИНКИ	ЛІДЕРИ ПРИБУТКОВСТІ	ОЩАДЛИВИЙ ВИБІР	СИЛОС ТА БЮГАЗ	КРУПА	СПИРТ ТА БІОЕТАНОЛ
ІНТЕНСИВНИЙ	-	СИ Памплона	270			●			●
	-	Спектрал НОВИНКА	320	●	●				●
	-	СИ Топаз НОВИНКА	340	●	●				
	-	СИ Артос НОВИНКА	370	●	●				
ПОМІРНО-ІНТЕНСИВНИЙ	● Артезіан™	СИ Шикарі	200			●			
	-	СИ Інвіктус	210			●	●	●	
	● Артезіан™	СИ Феномен	220			●			
	● Артезіан™	СИ Фрегат	250		●				●
	-	СИ Пандорас	250			●	●	●	
	● Артезіан™	СИ Олівія НОВИНКА	260	●	●				
	-	СИ Амфора	260				●		
	-	СИ Фігура НОВИНКА	280	●	●				
	● Артезіан™	СИ Чорінтос	290			●			
	-	СИ Еленор НОВИНКА	300	●	●				
ВИСОКОАДАПТИВНИЙ	● Артезіан™	СИ Електрон НОВИНКА	320	●	●				
	-	СИ Амбадор	230			●			
	● Артезіан™	СИ Фортаго	260			●			
	● Артезіан™	СИ Скорпіус	290			●			
	● Артезіан™	СИ Гранаріс	300		●				●

Зведена таблиця характеристик гібридів кукурудзи

ТИП АДАПТИВНОСТІ	АРТЕЗІАН™	ГІБРИД	ФАО	ВИКОРИСТАННЯ	ТИП ЗЕРНА	БАЛ (ЗА 9-БАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ)								ГУСТОТА, НА ПЕРІОД ЗБИР., ТИС. РОСЛ./ГА				ПРИДАТНІСТЬ ДО:		ВМІСТ В ЗЕРНІ, %	
						ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ	ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	ВОЛОГОВІДДАЧА	ТЕМП ПОЧАТКОВОГО РОСТУ	СТІЙКІСТЬ ПРОТИ		УМОВИ ВОЛОГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ									
												ДОСТАТНІ	НЕСТІЙКІ	НЕДОСТАТНІ	МОНОКУЛЬТУРИ	ПЕРЕСТОЮ НА КОРЕНІ	КРОХМАЛЬ	БІЛОК			
ІНТЕНСИВНИЙ	-	СИ Памплона	270	Зерно	Зуб.	7	8	9	8	8	9	60-70	50-60	-	-	-	71,5-73,6	7,9-9,1			
	-	Спектрал НОВИНКА	320	Зерно	Зуб.	8	7	8	8	8	9	60-70	55-60	-	+	-	72,1-74,7	7,9-8,4			
	-	СИ Топаз НОВИНКА	340	Зерно	Зуб.	8	8	8	8	9	9	60-70	55-60	-	+	+	70,0-73,9	8,1-8,9			
	-	СИ Артос НОВИНКА	370	Зерно	Зуб.	8	8	8	8	9	9	65-75	55-60	-	+	+	-	-			
ПОМІРНО-ІНТЕНСИВНИЙ		СИ Шикарі	200	Зерно	Зуб.	8	9	9	8	8	8	70-75	55-65	40-50	+	+	70,1-72,9	7,9-8,5			
	-	СИ Інвіктус	210	Зерно / крупа / силос / біогаз	Кр.-под.	8	9	8	8	9	8	70-75	60-70	45-60	+	-	71,0-73,3	7,7-8,1			
		СИ Феномен	220	Зерно	Зуб.	8	8	9	8	8	8	65-75	55-65	40-50	+	-	71,6-72,4	7,7-8,4			
		СИ Фрегат	250	Зерно	Зуб.	7	9	9	8	8	8	65-70	55-65	40-50	-	-	71,0-74,1	7,6-8,5			
	-	СИ Пандорас	250	Зерно / крупа / силос / біогаз	Кр.-под.	9	8	7	9	9	9	65-75	55-65	40-50	+	+	71,0-73,1	8,4-8,8			
		СИ Олівія НОВИНКА	260	Зерно	Зуб.	8	9	8	8	8	9	70-80	60-70	45-50	+	+	-	-			
	-	СИ Амфора	260	Силос, біогаз	Кр.-под.	8	7	7	9	8	9	75-80	70-75	-	-	-	-	-			
	-	СИ Фігура НОВИНКА	280	Зерно	Зуб.	8	8	9	8	9	9	70-80	60-70	45-50	+	+	-	-			
		СИ Чорінтос	290	Зерно	Зуб.	9	8	9	9	9	9	70-75	60-65	40-50	+	+	71,5-73,5	7,5-8,6			
	-	СИ Еленор НОВИНКА	300	Зерно	Зуб.	8	8	8	8	8	9	65-75	55-65	40-55	+	-	70,6-74,2	7,5-8,2			
	СИ Електрон НОВИНКА	320	Зерно	Зуб.	8	9	9	9	8	9	70-75	60-70	45-50	+	-	-	-				
ВИСОКОАДАПТИВНИЙ	-	СИ Амбадор	230	Зерно	Зуб.	8	8	9	8	8	9	65-75	55-65	40-55	+	+	70,3-73,7	7,5-8,5			
		СИ Фортаго	260	Зерно	Зуб.	7	9	9	9	8	8	65-70	60-65	40-50	+	+	70,6-73,2	8,7-9,6			
		СИ Скорпіус	290	Зерно	Зуб.	8	9	9	8	9	9	65-70	60-65	40-50	-	-	70,4-74,5	7,8-9,8			
		СИ Гранаріс	300	Зерно	Зуб.	8	9	9	8	8	9	70-75	60-70	40-50	+	+	71,5-74,6	8,0-9,8			



ШИКАРНА РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ РАНЬОГО ВРОЖАЮ

ГРУПА СТИГЛОСТІ	○ Середньоранній
ВИКОРИСТАННЯ	○ Зерно
ТИП ЗЕРНА	○ Зубоподібний
ТИП АДАПТИВНОСТІ	○ Помірно-інтенсивний

- ✔ Достатнє зволоження — 70–75 тис./га
- ✔ Нестійке зволоження — 55–65 тис./га
- ✔ Недостатнє зволоження — 40–50 тис./га


- ✓ Високий потенціал раннього врожаю
- ✓ Надзвичайно високий рівень посухостійкості
- ✓ Швидка вологовіддача зерна під час дозрівання
- ✓ Еректоїдний тип розміщення листків зменшує конкуренцію рослин у посіві за світло і підвищує ефективність фотосинтезу

[illegible]

До кореневих і стеблових гнилей ● ● ● ● ● ● ● ● ●

До сажкових хвороб ● ● ● ● ● ● ● ● ●

 Полісся
 Лісостеп
 Степ



- 72



ΦΑΟ ΖΙΟ

ГРУПА СТИГЛОСТІ	○ Середньоранній
ВИКОРИСТАННЯ	○ Крупа, зерно, силос, біогаз
ТИП ЗЕРНА	○ Кременистоподібний
ТИП АДАПТИВНОСТІ	○ Помірно-інтенсивний

- ✔ Достатнє зволоження — 70–75 тис./га
- ✔ Нестійке зволоження — 60–70 тис./га
- ✔ Недостатнє зволоження — 45–60 тис./га



- ✓ Високіврожайний скоростиглий гібрид, що дозволяє отримати ранній урожай зерна й поживного силосу для худоби
- ✓ Добра холодостійкість
- ✓ Раннє цвітіння і швидкий налив зерна

	Холодостійкість	
	Посухостійкість	
	Вологовіддача	
	Темп початкового росту	

До кореневих і стеблових гнилей ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

До сажкових хвороб ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Полісся



Лісостеп



Степ



ΦΑ0 220

- Помірно-інтенсивний




ΦΑ0 230

НАДІЙНІСТЬ В УМОВАХ СТРЕСУ

ГРУПА СТИГЛОСТІ	○	Середньоранній
ВИКОРИСТАННЯ	○	Зерно
ТИП ЗЕРНА	○	Зубоподібний
ТИП АДАПТИВНОСТІ	○	Високоадаптивний

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА РОСЛИН НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

- ✔ Достатнє зволоження — 65–75 тис./га
- ✔ Нестійке зволоження — 55–65 тис./га
- ✔ Недостатнє зволоження — 40–55 тис./га



- УРОЖАЙНІСТЬ (Ц/ГА) В ПЕРЕРАХУНКУ НА ВОЛОГІСТЬ ЗЕРНА 14 %, 2024 РІК
- ВОЛОГІСТЬ ЗЕРНА ПІД ЧАС ЗБИРАННЯ (%)

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ Високий потенціал урожаю
- ✓ Придатний для вирощування в зонах нестійкого зволоження
- ✓ Швидка вологовіддача зерна в період дозрівання
- ✓ Стійкий до кореневого і стеблового вилягання

ОЦІНКА ОЗНАК

- [illegible]

СТІЙКІСТЬ

- До кореневих і стеблових гнилей ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
- До сажкових хвороб ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ



Полісся



Лісостеп



Степ



СИ Фрегат


ФАО 250

КУРС НА ВИСОКУ
ВРОЖАЙНІСТЬ

- ГРУПА СТИГЛОСТІ
 - Середньоранній
- ВИКОРИСТАННЯ
 - Зерно
- ТИП ЗЕРНА
 - Зубоподібний
- ТИП АДАПТИВНОСТІ
 - Помірно-інтенсивний

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА РОСЛИН НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

- ✓ Достатнє зволоження — 65–70 тис./га
- ✓ Нестійке зволоження — 55–65 тис./га
- ✓ Недостатнє зволоження — 40–50 тис./га



- УРОЖАЙНІСТЬ (Ц/ГА) В ПЕРЕРАХУНКУ НА ВОЛОГІСТЬ ЗЕРНА 14 %, 2024 РІК
- ВОЛОГІСТЬ ЗЕРНА ПІД ЧАС ЗБИРАННЯ (%)

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ Високий потенціал урожаю
- ✓ Швидка вологовіддача зерна під час дозрівання
- ✓ Добра адаптованість до посушливих умов
- ✓ Висока стійкість до фузаріозу качана, висока якість зерна (експорт зерна)
- ✓ Вміст крохмалю в зерні становить 71,0–74,1 %

ОЦІНКА ОЗНАК

- ☀ Холодостійкість
- ☀ Посухостійкість
- 💧 Вологовіддача
- ✍ Темп початкового росту

СТІЙКІСТЬ

- До кореневих і стеблових гнилей
- До сажкових хвороб

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ

- Полісся
- Лісостеп
- Степ

ΦΑ0 250

ГРУПА СТИГЛОСТІ	○ Середньоранній
ВИКОРИСТАННЯ	○ Крупа, зерно, силос, біогаз
ТИП ЗЕРНА	○ Кременистоподібний
ТИП АДАПТИВНОСТІ	○ Помірно-інтенсивний



СИ Олівія


ФАО 260

ВИСОКА ВРОЖАЙНІСТЬ
ТА АДАПТИВНІСТЬ

ГРУПА СТИГЛОСТІ	○ Середньоранній
ВИКОРИСТАННЯ	○ Зерно
ТИП ЗЕРНА	○ Зубоподібний
ТИП АДАПТИВНОСТІ	○ Помірно-інтенсивний

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА РОСЛИН НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

- ✓ Достатнє зволоження — 70–80 тис./га
- ✓ Нестійке зволоження — 60–70 тис./га
- ✓ Недостатнє зволоження — 45–50 тис./га



- УРОЖАЙНІСТЬ (Ц/ГА) В ПЕРЕРАХУНКУ НА ВОЛОГІСТЬ ЗЕРНА 14 %, 2024 РІК
- ВОЛОГІСТЬ ЗЕРНА ПІД ЧАС ЗБИРАННЯ (%)

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ Високий потенціал урожаю в оптимальних умовах
- ✓ Висока стабільність при нестійкому зволоженні
- ✓ Відмінне запилення та озерненість качана
- ✓ Міцне стебло, висока стійкість до вилягання
- ✓ Хороша вологовіддача в своїй групі стиглості

ОЦІНКА ОЗНАК

☼ Холодостійкість	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
☀ Посухостійкість	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
💧 Вологовіддача	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
✍ Темп початкового росту	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

СТІЙКІСТЬ

До коренових і стеблових гнилей	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
До сажкових хвороб	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ



Полісся



Лісостеп



Степ



СИ Олівія

ФАО 260

ВИСОКА ВРОЖАЙНІСТЬ ТА АДАПТИВНІСТЬ

Тип зерна
ЗУБОПОДІБНИЙ

Тип адаптивності
ПОМІРНО-ІНТЕНСИВНИЙ

Високий потенціал урожаю
в оптимальних умовах

Висока стабільність
при нестійкому зволоженні

Міцне стебло, висока
стійкість до вилягання

Хороша вологовіддача
в своїй групі стиглості



СИ Амфора

ФАО 260

ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ
І ВИСОКОЯКІСНИЙ СИЛОС

- ГРУПА СТИГЛОСТІ

ВИКОРИСТАННЯ

ТИП ЗЕРНА

ТИП АДАПТИВНОСТІ
- Середньоранній

○ Біогаз, силос

○ Кременистоподібний

○ Помірно-інтенсивний

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА РОСЛИН НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

- ✓ Достатнє зволоження — 75–80 тис./га

✓ Нестійке зволоження — 70–75 тис./га

Назва показника	Показники класу силосу «Преміум»	Дані господарства (Волинська область, Луцький район)
ADF, %	< 25	20,2
NDF, %	< 36	36
NEL (Чиста енергія лактації), Мдж	> 6,897	7,44
Крохмаль, %	< 36	42,3

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ Урожайність зеленої маси — 550–600 ц/га

✓ Вміст сухої речовини — 34–37 %

✓ Швидкий стартовий ріст

✓ Вміст у листостебловій масі:

– крохмалю — 34,4–38,2 %

– протеїну — 6,3–6,5 %

✓ Енергія лактації — 6,6–7,1 МДж/кг

✓ Перетравність листостеблової маси — 74,5–75,4 %

ОЦІНКА ОЗНАК

- ☀

Холодостійкість

☀

Посухостійкість

💧

Вологовіддача

📏

Темп початкового росту
- ●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●

СТІЙКІСТЬ

- До кореневих і стеблових гнилей

До сажкових хвороб
- ●●●●●●●●●●

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ

- 🌿

Полісся


🌿

Лісостеп

🌿

Степ

УРОЖАЙНІСТЬ ЗЕЛЕНОЇ МАСИ, Ц/ГА





СИ Фортаго


ФАО 260

СТАБІЛЬНА ВРОЖАЙНІСТЬ
І ВІДМІННА ПОСУХОСТІЙКІСТЬ

ГРУПА СТИГЛОСТІ	○ Середньоранній
ВИКОРИСТАННЯ	○ Зерно
ТИП ЗЕРНА	○ Зубоподібний
ТИП АДАПТИВНОСТІ	○ Високоадаптивний

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА РОСЛИН НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

- ✓ Достатнє зволоження — 65–70 тис./га
- ✓ Нестійке зволоження — 60–65 тис./га
- ✓ Недостатнє зволоження — 40–50 тис./га



- УРОЖАЙНІСТЬ (Ц/ГА) В ПЕРЕРАХУНКУ НА ВОЛОГІСТЬ ЗЕРНА 14 %, 2024 РІК
- ВОЛОГІСТЬ ЗЕРНА ПІД ЧАС ЗБИРАННЯ (%)

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ Гібрид високоврожайний і стабільний
- ✓ Швидкий ріст на початку вегетації
- ✓ Еректоїдний тип розміщення листків
- ✓ Стійкий до вилягання й основних хвороб кукурудзи
- ✓ Вміст білка в зерні становить 8,7–9,6 %

ОЦІНКА ОЗНАК

❄ Холодостійкість	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
☀ Посухостійкість	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
💧 Вологовіддача	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
✍ Темп початкового росту	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

СТІЙКІСТЬ

До кореневих і стеблових гнилей	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
До сажкових хвороб	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ



Полісся



Лісостеп



Степ




СИ Памплона ФАО 270

НАДЗВИЧАЙНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
ЗА ІНТЕНСИВНИХ УМОВ

ГРУПА СТИГЛОСТІ	○ Середньоранній
ВИКОРИСТАННЯ	○ Зерно
ТИП ЗЕРНА	○ Зубоподібний
ТИП АДАПТИВНОСТІ	○ Інтенсивний

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА РОСЛИН НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

- ✓ Достатнє зволоження — 60–70 тис./га
- ✓ Нестійке зволоження — 50–60 тис./га



- УРОЖАЙНІСТЬ (Ц/ГА) В ПЕРЕРАХУНКУ НА ВОЛОГІСТЬ ЗЕРНА 14 %, 2024 РІК
- ВОЛОГІСТЬ ЗЕРНА ПІД ЧАС ЗБИРАННЯ (%)

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ Високоврожайний гібрид, чудово реагує на високий агрофон
- ✓ Забезпечує високу окупність добрив за інтенсивної технології вирощування
- ✓ Швидка вологовіддача зерна під час дозрівання

ОЦІНКА ОЗНАК

☀ Холодостійкість	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
☀ Посухостійкість	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
💧 Вологовіддача	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
✏ Темп початкового росту	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

СТІЙКІСТЬ

До кореневих і стеблових гнилей	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
До сажкових хвороб	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ

 Полісся

 Лісостеп



Державна реєстрація очікується в грудні 2025 року*

НОВИНКА

СИ Фігура


ФАО 280

ПОТУЖНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

- ГРУПА СТИГЛОСТІ
 - Середньоранній
- ВИКОРИСТАННЯ
 - Зерно
- ТИП ЗЕРНА
 - Зубоподібний
- ТИП АДАПТИВНОСТІ
 - Помірно-інтенсивний

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА РОСЛИН НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

- ✓ Достатнє зволоження — 70–80 тис./га
- ✓ Нестійке зволоження — 60–70 тис./га
- ✓ Недостатнє зволоження — 45–50 тис./га



- УРОЖАЙНІСТЬ (Ц/ГА) В ПЕРЕРАХУНКУ НА ВОЛОГІСТЬ ЗЕРНА 14 %, 2024 РІК
- ВОЛОГІСТЬ ЗЕРНА ПІД ЧАС ЗБИРАННЯ (%)

* Державна реєстрація цього гібрида та внесення його до Державного реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні, планується в грудні 2025 року.

Каталог гібридів соняшнику та кукурудзи • Насіння кукурудзи

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ Високий потенціал урожаю
- ✓ Витримує помірний стрес
- ✓ Раннє цвітіння у своїй групі стиглості, швидкий налив зерна
- ✓ Хороша вологовіддача
- ✓ Міцне стебло, може витримувати пізні збирання

ОЦІНКА ОЗНАК

- ❄ Холодостійкість
- ☀ Посухостійкість
- 💧 Вологовіддача
- ✂ Темп початкового росту

СТІЙКІСТЬ

- До корневих і стеблових гнилей
- До сажкових хвороб

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ



Полісся



Лісостеп



Степ


syngenta®



ΦΑ0 290

ГРУПА СТИГЛОСТІ	○ Середньоранній
ВИКОРИСТАННЯ	○ Зерно
ТИП ЗЕРНА	○ Зубоподібний
ТИП АДАПТИВНОСТІ	○ Помірно-інтенсивний

- ✔ Достатнє зволоження — 70–75 тис./га
- ✔ Нестійке зволоження — 60–65 тис./га
- ✔ Недостатнє зволоження — 40–50 тис./га



- 84

- ✔ Гібрид здатний забезпечувати високу і стабільну врожайність у різних ґрунтово-кліматичних умовах
- ✔ Швидкий ріст на початку вегетації
- ✔ Швидка вологовіддача зерна під час дозрівання

[illegible]

До кореневих і стеблових гнилей ● ● ● ● ● ● ● ●

До сажкових хвороб ● ● ● ● ● ● ● ●



ВИСОКИЙ РІВЕНЬ УРОЖАЙНОСТІ ЗА СТРЕСОВИХ УМОВ

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА РОСЛИН НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

-
- | Region | Average number of employees per enterprise | Percentage of total |
|---|--|---------------------|
| Тернопільська обл., Тернопільський р-н | 153,0 | 21,8 % |
| Львівська обл., Золочівський р-н | 141,5 | 20,8 % |
| Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н | 136,6 | 17,1 % |
| Київська обл., Обухівський р-н | 129,1 | 16,3 % |
| Вінницька обл., Вінницький р-н | 121,1 | 17,4 % |
| Житомирська обл., Житомирський р-н | 106,0 | 16,5 % |
| Черкаська обл., Черкаський р-н | 101,6 | 15,5 % |
| Сумська обл., Сумський р-н | 86,1 | 11,2 % |
| Харківська обл., Богодухівський р-н | 70,5 | 13,2 % |
| Полтавська обл., Полтавський р-н | 69,8 | 11,1 % |
| Кіровоградська обл., Голованівський р-н | 65,7 | 12,1 % |

- ✓ Високоврожайний гібрид, який демонструє стабільну врожайність у різних ґрунтово-кліматичних умовах
- ✓ Швидка вологовіддача зерна під час дозрівання
- ✓ Добре адаптований для вирощування за посушливих умов
- ✓ Еректоїдний тип розміщення листків, підвищена ефективність фотосинтезу

[illegible]

До кореневих і стеблових гнилей

До сажкових хвороб

 Полісся
 Лісостеп
 Степ

**ΦΑ0 300**

ГРУПА СТИГЛОСТІ

- Середньостиглий

ВИКОРИСТАННЯ

- Зерно


ТИП ЗЕРНА

- Зубоподібний

ТИП АДАПТИВНОСТІ

- Високоадаптивний

- ✔ Достатнє зволоження — 70–75 тис./га
- ✔ Нестійке зволоження — 60–70 тис./га
- ✔ Недостатнє зволоження — 40–50 тис./га



- ### ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- ✓ Високі потенціал урожайності й адаптивна здатність, рівень посухостійкості та пластичності
 - ✓ Відмінна текстура і велика маса 1000 зерен
 - ✓ Інтенсивна вологовіддача
 - ✓ Високі показники стійкості до хвороб

[illegible]

До кореневих і стеблових гнилей ● ● ● ● ● ● ● ● ●

До сажкових хвороб ● ● ● ● ● ● ● ● ●

 Полісся
 Лісостеп
 Степ



СИ Гранаріс **ФАО 300**

ЗАРЯДЖЕНИЙ НА ВРОЖАЙ

Тип зерна
ЗУБОПОДІБНИЙ

Тип адаптивності
ПОМІРНО-ІНТЕНСИВНИЙ





LIVE-фото

НОВИНКА

СИ Еленор


ФАО 300

ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ
В МІНЛИВИХ УМОВАХ

ГРУПА СТИГЛОСТІ	○ Середньостиглий
ВИКОРИСТАННЯ	○ Зерно
ТИП ЗЕРНА	○ Зубоподібний
ТИП АДАПТИВНОСТІ	○ Помірно-інтенсивний

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА РОСЛИН НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

- ✓ Достатнє зволоження — 65–75 тис./га
- ✓ Нестійке зволоження — 55–65 тис./га
- ✓ Недостатнє зволоження — 40–55 тис./га



- УРОЖАЙНІСТЬ (Ц/ГА) В ПЕРЕРАХУНКУ НА ВОЛОГІСТЬ ЗЕРНА 14 %, 2024 РІК
- ВОЛОГІСТЬ ЗЕРНА ПІД ЧАС ЗБИРАННЯ (%)

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ Високий потенціал урожаю
- ✓ Стійкий до повітряної та ґрунтової посухи
- ✓ Вміст білка в зерні — 7,5–8,2 %
- ✓ Вміст крохмалю — 70,6–74,2 %
- ✓ Рекомендовано збирати в оптимальні терміни
- ✓ Раннє цвітіння
- ✓ Швидкий налив зерна

ОЦІНКА ОЗНАК

☼ Холодостійкість	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
☀ Посухостійкість	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
💧 Вологовіддача	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
📏 Темп початкового росту	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

СТІЙКІСТЬ

До кореневих і стеблових гнилей	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
До сажкових хвороб	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ



Полісся



Лісостеп



Степ



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ Високий потенціал урожаю
- ✓ Забезпечує добру окупність на інтенсивному фоні
- ✓ Завдяки міцному стеблу витримує помірні перестої
- ✓ Маса 1000 зерен — 212–250 г
- ✓ Вміст білка в зерні — 7,9–8,4 %
- ✓ Вміст крохмалю — 72,1–74,7 %

ОЦІНКА ОЗНАК

- ❄ Холодостійкість ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
- ☀ Посухостійкість ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
- 💧 Вологовіддача ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
- ✍ Темп початкового росту ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

СТІЙКІСТЬ

- До корневих і стеблових гнилей ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
- До сажкових хвороб ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ

-  Полісся
-  Лісостеп

Спектрал


ФАО 320

НАДІЙНИЙ ПАРТНЕР В ІНТЕНСИВНИХ УМОВАХ


- ГРУПА СТИГЛОСТІ ○ Середньостиглий
- ВИКОРИСТАННЯ ○ Зерно
- ТИП ЗЕРНА ○ Зубоподібний
- ТИП АДАПТИВНОСТІ ○ Інтенсивний

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА РОСЛИН НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

- ✓ Достатнє зволоження — 60–70 тис./га
- ✓ Нестійке зволоження — 55–60 тис./га



- УРОЖАЙНІСТЬ (Ц/ГА) В ПЕРЕРАХУНКУ НА ВОЛОГІСТЬ ЗЕРНА 14 %, 2024 РІК
- ВОЛОГІСТЬ ЗЕРНА ПІД ЧАС ЗБИРАННЯ (%)



СИ Електрон

ΦΑ0 320

ГРУПА СТИГЛОСТІ

- Середньостиглий

ВИКОРИСТАННЯ

- Зерно

ТИП ЗЕРНА

- Зубоподібний

ТИП АДАПТИВНОСТІ

- Помірно-інтенсивний

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА РОСЛИН НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

- ✔ Достатнє зволоження — 70–75 тис./га
- ✔ Нестійке зволоження — 60–70 тис./га
- ✔ Недостатнє зволоження — 45–50 тис./га



- * Державна реєстрація цього гібрида та внесення його до Державного реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні, планується в грудні 2025 року.

- ✓ Високий потенціал урожаю
- ✓ Висока посухостійкість
- ✓ Адаптивний до різних умов вирощування
- ✓ Швидка вологовіддача зерна

[illegible]

До кореневих і стеблових гнилей ● ● ● ● ● ● ● ● ●

До сажкових хвороб ● ● ● ● ● ● ● ● ●

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ



Полісся



Лісостеп



Степ



СИ Електрон*

ФАО 320

ПЕРЕВИЩУЄ ОЧІКУВАННЯ

Тип зерна
ЗУБОПОДІБНИЙ

Тип адаптивності
ПОМІРНО-ІНТЕНСИВНИЙ

Високий
потенціал урожаю

Висока
посухостійкість

Адаптивний до різних
умов вирощування

Швидка
вологівіддача зерна

* Державна реєстрація цього гібрида та внесення його до Державного реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні, планується в грудні 2025 року.

syngenta



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ Високий потенціал урожаю
- ✓ Витримує помірний стрес від посухи
- ✓ Завдяки дуже міцному стеблу витримує тривалі перестой
- ✓ Вміст білка в зерні — 8,1–8,9 %
- ✓ Вміст крохмалю в зерні — 70,0–73,9 %

ОЦІНКА ОЗНАК

- ☀ Холодостійкість ●●●●●●●●●●
- ☀ Посухостійкість ●●●●●●●●●●
- 💧 Вологовіддача ●●●●●●●●●●
- ✍ Темп початкового росту ●●●●●●●●●●

СТІЙКІСТЬ

- До коренових і стеблових гнилей ●●●●●●●●●●
- До сажкових хвороб ●●●●●●●●●●

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ

-  Полісся
-  Лісостеп

СИ Топаз

ФАО 340

ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ
ТА СТІЙКІСТЬ ДО СТРЕСІВ

ГРУПА СТИГЛОСТІ	○ Середньостиглий
ВИКОРИСТАННЯ	○ Зерно
ТИП ЗЕРНА	○ Зубоподібний
ТИП АДАПТИВНОСТІ	○ Інтенсивний

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА РОСЛИН
НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

- ✓ Достатнє зволоження — 60–70 тис./га
- ✓ Нестійке зволоження — 55–60 тис./га



- УРОЖАЙНІСТЬ (Ц/ГА) В ПЕРЕРАХУНКУ НА ВОЛОГІСТЬ ЗЕРНА 14 %, 2024 РІК
- ВОЛОГІСТЬ ЗЕРНА ПІД ЧАС ЗБИРАННЯ (%)

ΦΑ0 370

ГРУПА СТИГЛОСТІ	○ Середньостиглий
ВИКОРИСТАННЯ	○ Зерно
ТИП ЗЕРНА	○ Зубоподібний
ТИП АДАПТИВНОСТІ	○ Інтенсивний

- ✔ Достатнє зволоження — 65–75 тис./га
- ✔ Нестійке зволоження — 55–60 тис./га


- ✓ Високий потенціал урожаю
- ✓ Забезпечує добру окупність інтенсивних технологій
- ✓ Добре витримує помірний стрес
- ✓ Висока стійкість до основних хвороб
- ✓ Міцне стебло, здатне витримувати пізні збирання
- ✓ Придатний для вирощування на зрошенні

[illegible]

До кореневих і стеблових гнилей

До сажкових хвороб

 Полісся
 Лісостеп
 Степ



- 

Препарати і строки їх застосування на кукурудзі

Проблеми при вирощуванні	Дозування												
		00	11	12	13	15	17/32	18/33	35	53	63	89	
Біологічна фіксація азоту та постачання його рослині	50 г/га						ВІКСЕРАН	NEW					
Ризиктоніоз, стимулювання розвитку кореневої системи	4 мл/1 п. о.												
Ризиктоніоз, стимулювання розвитку кореневої системи, летюча сажка	24 мл/1 п. о.												
Стеблові та кореневі гнилі, пліснявіння насіння і гельмінтоспоріоз	1,0 л/т												
Стеблові та кореневі гнилі, пліснявіння насіння	1,0 л/т												
Дротяники, несправжні дротяники, чорниші, шведські мухи, попелиці, білшки, західний кукурудзяний жук (діабротика)	6,0–9,0 л/т												
	5,0–6,0 л/т												
Однорічні злакові та дводольні бур'яни	2,5–3,5 л/га												
	4,0–4,5 л/га												
Однорічні злакові та дводольні бур'яни, деякі багаторічні дводольні бур'яни	3,5–4,0 л/га												
Однорічні й багаторічні дводольні бур'яни, в т. ч. осоти і падалиця соняшнику (ІМІ- та сульфостійка)	0,5; 0,7 л/га												
Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни	1,0–1,25 л/га												
Однорічні дводольні та деякі багаторічні дводольні бур'яни (у т. ч. стійкі до 2,4-Д і МЦПА), а також падалиця соняшнику й ріпаку	0,015–0,02 кг/га												
Однорічні й багаторічні злакові (у т. ч. сорго і пирій) та деякі однорічні дводольні бур'яни	1,0–1,25 л/га + ПАР*												
Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни	0,2–0,25 л/га + ПАР*												
Однорічні та багаторічні злакові й дводольні бур'яни (у т. ч. ваточник сирійський)	1,25–2,0 л/га												
Однорічні та багаторічні, злакові та дводольні бур'яни	1,0-1,33 л/га												
Західний кукурудзяний жук, ґрунтові шкідники	12,0–15,0 кг/га												
Дротяники	6,0–8,0 кг/га												
Стебловий кукурудзяний метелик, західний кукурудзяний жук	0,2–0,3 л/га												
Стебловий кукурудзяний метелик, попелиці	1,2–2,0 л/га												
Бавовникова совка і стебловий кукурудзяний метелик	0,2–0,3 л/га												
Стебловий кукурудзяний метелик	0,2 л/га												
Гельмінтоспоріозна й інші плямистості листя, іржа, фузаріоз, пухирчаста сажка	0,5–0,75 л/га												
Підвищення стійкості рослин до несприятливих умов	1,0–2,0 л/га												



Elevation^{Plus}

МАКСИМАЛЬНЕ
РОЗКРИТТЯ

ГЕНЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
НАСІННЯ



Elevation

ОПТИМАЛЬНЕ
ПОЄДНАННЯ
ДЛЯ ЗАХИСТУ НАСІННЯ

syngenta®

СЕРВІСИ ТА ПОСЛУГИ

АгроГід	98
Як замовити сервіс	105
Cropwise Planting.....	106
Cropwise® Seed Selector	108
Продукти Syngenta Seedcare™	110
ФОРМУЛА М	113
Майстерня Аграрія	114
Welcome to Syngenta Training Center!.....	115






АгроГід — це унікальна інноваційна програма технічної підтримки, яка охоплює:

- Широкий спектр послуг мережі діагностичних центрів
- Сервіс налаштування обприскувачів та перевірки якості внесення
- Польовий моніторинг
- Тренінги, навчання і консультації експертів компанії «Сингента»
- Сервіс калібрування протруювальних машин та перевірки якості нанесення



Програма технічної підтримки протягом року



Сервіс «Встановлення рівня гібридності (типовості) гібридів соняшнику й кукурудзи»



Створені компанією «Сингента» гібриди соняшнику й кукурудзи мають цінні біологічно-агрономічні властивості, а отже, гарантують очікувану врожайність. Сервіс «Встановлення рівня гібридності (типовості) гібридів соняшнику й кукурудзи» дозволяє підтвердити оригінальність придбаного насіння. Тривалість експертизи — 5–7 днів.

Вирощування тільки оригінального насіння забезпечує отримання врожаю з очікуваними біологічно-агрономічними характеристиками

СЕРВІС ПЕРЕДБАЧАЄ:

- Встановлення належності/неналежності партії насіння або рослин у полі до певного гібрида соняшнику чи кукурудзи компанії «Сингента»
- Аналіз партії насіння або рослинного матеріалу за допомогою ДНК-маркерів (мікросателітів)
- Виявлення рівня гібридності (типовості) партії насіння гібридів соняшнику чи кукурудзи компанії «Сингента»
- Можливість встановити належність гібридів соняшнику чи кукурудзи до F1 поколінь
- Можливість виявити домішки сторонніх сортів та/або гібридів соняшнику чи кукурудзи




Сервіс «Посівні якості насіння»



Дозволяє визначити посівну придатність насіння сільськогосподарських культур із використанням нормативних документів (ДСТУ 4138–2002). Згідно з результатами експертизи надаються рекомендації. Тривалість експертизи — 7–14 днів (залежно від культури).

СЕРВІС ПЕРЕДБАЧАЄ:

- Визначення енергії і схожості насіння
- Визначення маси 1000 насінин (за запитом для непротруєного насіння)
- Аналіз чистоти й відходу насіння (за запитом для непротруєного насіння)
- Надання рекомендацій згідно з результатами експертизи




Сервіс «Визначення вмісту олеїнової кислоти» (експрес-метод)



Сервіс дозволяє визначити вміст олеїнової кислоти у високоолеїнових гібридах (Тутті, СИ Феномено, СИ Експерто, Суліано, Субео СИ Флавіо КЛП, СИ Дієго КЛП.) соняшнику для контролю якості продукції при збиранні, транспортуванні та зберіганні врожаю. Тривалість експертизи — до 3 днів.

СЕРВІС ПЕРЕДБАЧАЄ:



- Визначення вологості насіння соняшнику
- Визначення натури
- Визначення вмісту олеїнової кислоти
- Надання рекомендацій згідно з результатами експертизи



Як відібрати зразки

ВІДБІР СЕРЕДНЬОЇ ПРОБИ НАСІННЕВОГО МАТЕРІАЛУ

У кожній означеній точці відбирають пробу з трьох шарів:



Формують середню пробу

Маса середньої проби має становити $2,0 \pm 0,1$ кг

Кількість мішків/контейнерів, шт.



Від кожного мішка, але не менше як 5



Від 5 мішків або одна від кожного третього, але не менше як 5




Від 10 мішків або одна від кожного п'ятого, але не менше як 10



Від 80 мішків або одна від кожного сьомого, але не менше як 80

ВІДБІР РОСЛИННОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ТИПОВОСТІ

По діагоналі поля з різних рослин стерильно відбирати 60 листків



Спеціалізація діагностичних центрів і тривалість експертизи

№ сервісу	Сервіс	Тривалість експертизи	Діагностичні центри		
			БДЦ	ХДЦ	ХмДЦ
1	Посівні якості насіння	7–14 днів (залежно від культури)	✓	✓	✓
2	Фітоекспертиза насіннєвого матеріалу	10–14 днів (залежно від культури)	✓	✓	✓
3	Фітоекспертиза рослинного матеріалу	8–10 днів (залежно від культури)	✓	✓	✓
4	Встановлення рівня гібридності (типовості) гібридів соняшнику й кукурудзи	5–7 днів	✓		
5	ПЛР-діагностика насіннєвого і рослинного матеріалів	2–3 дні	✓		
6	Імуноферментний аналіз насіннєвого матеріалу	40 днів	✓		
7	Імуноферментний аналіз рослинного матеріалу	2–3 дні	✓		
8	Фітопатогенне навантаження закритого ґрунту	7–14 днів	✓		
9	Аналіз якості води для внесення ЗЗР	4–5 днів			✓
10	Визначення вмісту олеїнової кислоти (експрес-метод)	До 3 днів	✓	✓	✓

Контактна інформація

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР (БДЦ)	ХАРКІВСЬКИЙ ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР (ХДЦ)	ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР (ХмДЦ)
Аліса Кучер <i>Керівниця групи діагностичних центрів</i> +380 67 138 10 78 Alisa.Kucher@syngenta.com	Тетяна Малина <i>Менеджерка лабораторії</i> +380 67 555 26 89 Tetyana.Malyna@syngenta.com	Катерина Даценко <i>Менеджерка лабораторії</i> +380 67 466 88 63 Kateryna.Datcenko@syngenta.com
Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Мала Вільшанка, відділок Селекційний, вул. Молодіжна, 22	м. Харків, вул. Драгомирівська, 10, оф. 6	м. Хмельницький, вул. Свободи, 18/2, поверх 9-й



Як замовити сервіс



Якщо у вас виникають питання, будь ласка,
звертайтеся до консультаційного центру компанії «Сингента»

0 800 50 04 49



Cropwise Planting

Розкрийте потенціал свого поля та генетику гібридів!

Cropwise Planting (КропВайз Плентінг) — це технологія цифрової агрономії й точного землеробства, яка забезпечує економічну ефективність та оптимізацію витрат з гектара завдяки застосуванню диференційованої норми висіву гібридів кукурудзи Syngenta.



Велика база даних, сформована за результатами досліджень на експериментальних локаціях з різними гібридами й густотою



Математична модель реакції на норму висіву з урахуванням індивідуальної генетики кожного гібрида Syngenta в зонах продуктивності кожного поля




Потенціал збільшення ефективності використання ресурсів, насіння та оптимізації витрат на посівну

Що дає аграріям використання Cropwise Planting?



- Науково обґрунтовані норми висіву для цільових гібридів Syngenta як оригінатора насіння.
- Економічну ефективність та оптимізацію врожайності кукурудзи на зерно в діапазоні 3–8 % на полях із високою неоднорідністю.
- Візуалізацію зон продуктивності на основі багаторічної вегетації за супутниковими знімками.

- Прозорий процес формування карт висіву зі змінними нормами залежно від обраної стратегії.
- Ефективне використання площі поля завдяки його зонуванню.
- Просте використання й налаштування.




- Сумісність із різною технікою точного землеробства.
- Можливість аналізу ефективності точного землеробства завдяки закладенню контрольних ділянок у карту диференційованого висіву.



Cropwise
Seed Selector

Персоналізовані рекомендації з вибору гібридів

Cropwise® Seed Selector — це онлайн-рішення з підбору гібридів кукурудзи й соняшнику Syngenta під ґрунтово-кліматичні умови конкретного поля.



Переваги використання Cropwise® Seed Selector:

- Заощаджує час та полегшує вибір гібридів
- Формує рекомендації на основі великої бази аналітичних даних, що опрацьовується через імітаційне математичне моделювання
- Дозволяє максимізувати врожай і продуктивність вашого поля



Компоненти рішення Cropwise® Seed Selector:



Оцінка імовірності сезонних стресів (повітряної і ґрунтової посух) на основі історичних погодних даних, накопичених із 2000 року



Урахування домінантних типів ґрунтів для обраного поля



База даних урожайності гібридів кукурудзи й соняшнику зі 66 000 дослідницьких локацій Syngenta



Математична модель, базована на розрахунку середньозваженої продуктивності гібридів з урахуванням імовірності певних погодних умов для конкретної місцевості



Напрацьований досвід із надання рекомендацій на понад 100 млн га по всьому світі


НАНЕСЕННЯ

ПРОДУКТИ

СЕРВІСИ



Більше,
ніж захист насіння



Продукти Syngenta Seedcare™ дозволяють зберегти і збільшити потенціал урожаю рослин, забезпечуючи їх захист від різноманітних захворювань та шкідників на найраніших стадіях.

Сучасні технології і продукти, які використовуються в обробці насіння, розвиваються надзвичайно швидкими темпами. Вони пом'якшують вплив таких агресивних чинників навколишнього середовища, як засуха й заморозки, збільшують концентрацію поживних речовин, сприяють ефективному використанню води.

 **Вайбранс®**



 **Форс®**



 **Круїзер®**




 **Максим®**




 **Сепест®**




 **Апрон® XL**




 **Еквенто®**
PLINAZOLIN® technology



 **Енівіо®**



 **Атува®**



Вайбранс® Інтеграл
Формула М

Сепест® Макс
Формула М

Попередники



+ 15 % контроль шкідників
+ Тифульоз, ризоктоніоз
+ 20 % септоріоз
+ 25 % снігова пліснява
+ 15 % розвиток коріння
+ 15 % урожайність

Злакові мухи,
хлібний турун,
хлібні блішки,
попелиці, дротяники,
ковалики

Сажкові хвороби
Кореневі гнилі
Гельмінтоспори
Фузаріози
Септоріози
Снігова пліснява

Попередники



+ Тифульоз, ризоктоніоз
+ 20 % септоріоз
+ 25 % снігова пліснява
+ 15 % розвиток коріння
+ 15 % урожайність

+ 20 % септоріоз
+ 20 % снігова пліснява
+ Офіобольоз
+ Гібеліноз

Вайбранс® Тріо
Формула М

Максим® Форте
Формула М

ФОРМУЛА М

Формула М — інноваційна розробка компанії «Сингента» у формуляції протруйників насіння. Сучасні компоненти в складі препарату дозволяють забезпечити його незмінну стабільність на поверхні насіння



На 10–15 %
покращено текучість насіння

Збільшення виробничості
при обробці та висіві

У 5–7 разів
зменшено кількість пилу
в протруєному насінні


Мінімізація втрат д. р. і безпека
використання продукту

Рівномірний
розподіл продукту на насінні
і візуальний контроль якості

Інтенсивне забарвлення і рівномірне
покриття кожної насінини

При вартості фунгіцидного протруйника
25 \$/т втрати становлять 4 \$/т

При вартості інсекто-фунгіцидного
протруйника 60 \$/т втрати становлять 9 \$/т



Щоб максимально заощадити ваші
витрати, технологія **Формула М**
гарантує, що ваш препарат буде
там, де й має бути, — на насінні

ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ ПРО

 **Вайбранс® Інтеграл**
Формула М

Запатентований фунгіцидний захист на основі нової молекули
Седаксан™ — першої молекули, розробленої компанією
«Сингента» безпосередньо для захисту насіння



Майстерня Аграрія



Навчальна платформа для аграрної спільноти України, яка допомагає ділитися досвідом та отримувати практичні знання протягом усього року



КОНФЕРЕНЦІЇ

Проходять перед початком посівної кампанії — наприкінці січня і на початку лютого. Тематика зосереджується на викликах сезону, які чекатимуть аграріїв поточного року. Конференції присвячено основним культурам і специфіці регіонів, у яких вони відбуваються, та висвітлюють важливі технічні питання в комплексі з економічними аспектами вирощування сільгоспкультур.



ФІЛДТУРИ «ІДЕМО В ПОЛЯ» ТА ПОЛЬОВІ ЗАХОДИ

Влітку й восени ми подорожуємо до виробничих посівів господарств та демоділянок у різних куточках України. У виробничих масштабах обрати доцільну систему захисту й гібриди насіння набагато легше. Мандруючи від поля до поля, господарства-господарі та експерти компанії «Сингента» діляться досвідом у вирощуванні й захисті польових культур.



ЖУРНАЛ

Актуальні новинки аграрного бізнесу, корисні статті від кращих спеціалістів і експертів, нові ідеї — усе це ви знайдете в кожному номері нашого журналу.

Журнал виходить тричі на рік, у паперовому вигляді розсилається адресно, в електронному вигляді доступний на сайті «Сингента».



РОЗДІЛ НА САЙТІ

Розділ «Майстерня Аграрія» містить повне зібрання інформації, презентованої на конференціях та польових заходах, а також фото і відеоматеріали.



Welcome to Syngenta Training Center!

Цьогоріч з метою створити спільноту професійних аграріїв на базі дослідних станцій Syngenta запроваджено освітню програму Syngenta Training Center

Навчальна програма охоплює найактуальніші теми й напрями про те, як максимально розкрити потенціал поля та підвищити ефективність бізнесу:

- практично-польові заняття з оглядами різноманітних дослідів;
- теоретичні класи з інновацій в агроіндустрії;
- обмін досвідом від міжнародних та українських експертів;
- консультації й рекомендації з технологій вирощування;
- залучення провідних іноземних і українських фермерів.



Корпоративна соціальна відповідальність

Соціальна відповідальність — невід’ємна частина діяльності нашої компанії. Вона пронизує все, що ми робимо: від розробки інноваційних продуктів до дбайливого ставлення до довкілля. Ми турбуємось про суспільство, піклуємося про майбутні покоління, підтримуємо наших працівників і переконані, що саме такі дії роблять нас і нашу країну успішними.

З початком повномасштабної війни «Сингента» постійно докладає зусиль для підтримки наших колег, партнерів і місцевих громад. Це стало ще одним підтвердженням того, що відповідальність перед суспільством для нас — не формальність, а щоденна реальність.

Наші КСВ-проекти — це більше ніж зміцнення репутації чи розширення партнерств. Це наш обов’язок перед людьми та громадами, з якими ми працюємо. Ми впевнені, що компанія може бути успішною лише тоді, коли робить внесок у розвиток суспільства й створює можливості для інших.

Основні напрями соціальної відповідальності:

1. Освітні ініціативи — виховання нового покоління аграріїв, партнерство з навчальними закладами, створення можливостей для професійного розвитку.
2. Турбота про людей — розвиток команди, формування корпоративної культури, баланс між роботою і відпочинком, підтримка ментального здоров’я.
3. Волонтерські активності — допомога громадам, благодійним фондам та організаціям, підтримка ініціатив співробітників.

СОЦІАЛЬНО-ОСВІТНІЙ НАПРЯМ

Співпраця зі спеціалізованими навчальними закладами

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді (НЕНЦ)

Головна мета — розвиток талановитої молоді в аграрній сфері та популяризація професії аграрія.

Кожної весни учні НЕНЦ спільно з фахівцями нашої компанії закладають польові дослідження з вивчення сучасних гібридів овочевих культур на навчально-дослідній ділянці.

Компанія «Сингента» виступає партнером Всеукраїнського форуму юних аграріїв, який проходить в Одесі в таборі «Молода гвардія», та Зльоту дослід-





ників-природознавців у Києві. Аграрні гуртки, презентації дослідів, агроквест, екскурсії до клієнтів і в лабораторію компанії «Сингента» — усе це частина форуму, у якому беруть участь понад 100 дітей з усієї України.

Плідна співпраця з НЕНЦ ознаменувалася відкриттям восени 2017 року «Агрокласу». Основні напрями його роботи охоплюють підготовку учнів до практичної й експериментально-дослідної роботи в галузі сільського господарства, ознайомлення із сучасними технологіями вирощування с.-г. культур, заняття з агрономії й агроекології для учнів загальноосвітніх навчальних закладів України і Києва, практичні й лабораторні заняття для учнів аграрного відділення Всеукраїнської природничої школи НЕНЦ, допрофесійну підготовку та навчальну практику для студентів аграрних і педагогічних вишів України.

УКРАЇНСЬКИЙ ПАКТ ЗАРАДИ МОЛОДІ 2025

Компанія «Сингента» підписала Український пакт заради молоді 2025. Цей пакт покликаний сприяти, зміцнювати і розвивати співпрацю між бізнесом та освітнім сектором з метою забезпечення якісної освіти, додаткових місць для стажування й першого місця роботи молодих талантів до 2025 року.

Ми співпрацюємо з аграрними університетами по всій Україні, організовуємо

конкурси проектних робіт для талановитих студентів та залучаємо найактивніших зацікавлених студентів до високоякісних програм стажування із забезпеченням менторської підтримки і найкращих практик. У майбутньому вони зможуть скласти кадровий резерв компанії або навіть стати її спеціалістами. Адже це справді важливо — залучати талановиту молодь до розвитку цікавих і перспективних напрямів сільського господарства в Україні.

GENERATION A

Новітній освітній проєкт Generation A спрямовано на співпрацю з університетами і розвиток талановитої аграрної молоді. Generation A — це про агроосвіту, про нове покоління та про підготовку молодих і досвідчених кадрів для сільськогосподарської галузі.

У рамках освітньої програми наймотивованіші студенти агрономічних вишів отримають можливість попрактикуватися з досвідченими менторами «Сингента» у справжніх польових умовах і лабораторіях, навчитися сучасних технологій, освоїти інноваційні підходи, роботу на новітньому обладнанні

і водночас прокачати комунікабельність та вміння працювати в команді. Програма навчання містить чотири модулі — агрономія, маркетинг, продажі, soft skills, а також цікаві лекції і практичні заняття, екскурсії й поїздки на R&D станції та в лабораторії. Після завершення найкращих студентів буде запрошено на стажування і практику до компанії «Сингента» та її партнерів.

У рамках проєкту Generation A «Сингента» підписала меморандуми про науково-технічну, дослідницьку і демонстраційну співпрацю з Полтавською державною аграрною академією (ПДАА), Одеським державним аграрним університетом (ОДАУ), Харківським національним аграрним університетом ім. В. В. Докучаєва та Білоцерківським національним аграрним університетом і надалі планує розширювати територію свого впливу.

Для нас також дуже важливо залучати до освітніх проєктів співробітників. Справді, менеджери сповнені ентузіазму, їм подобається ділитися своїми знаннями й досвідом, робити внесок у розвиток майбутніх професіоналів та розуміти, що в їхніх силах змінити світогляд молоді.





ТУРБОТА ПРО ПРАЦІВНИКІВ

Будь-яка компанія, щоб бути успішною, повинна турбуватися про свій персонал. Наші працівники — це головна цінність компанії. А в центрі уваги «Сингента» — здоров'я, баланс і професійний розвиток працівника. Щоб установити баланс і створити комфортні умови роботи, компанія інвестує в систему мотивації співробітників, пільги, навчання, формування корпоративної культури та відпочинок колег.

Фонд «Дихай»

На початку повномасштабної війни в компанії було створено фонд «Дихай», щоб оперативно підтримувати колег у критичних ситуаціях. Завдяки йому покрито більше п'яти сотень термінових запитів — від медичної допомоги до базових потреб для родин. Загалом у фонд уже інвестовано понад 2 000 000 доларів, що дозволило забезпечити реальну допомогу нашим працівникам і їхнім сім'ям у найскладніші часи.

Компенсації й пільги

Оплата харчування. Усі співробітники компанії отримують компенсаційну виплату за харчування, визначену згідно з політикою компанії.

Компенсаційні виплати. Компанія визначила такі компенсаційні виплати:

- Виплата при народженні дитини
- Премія за вислугу років у компанії
- Допомога при одруженні
- Виплата до ювілею
- Бонус за безаварійне керування службовим автомобілем
- Допомога при виході на пенсію
- Допомога в разі смерті члена сім'ї

Медичне страхування. На всіх працівників компанії поширюється дія програми медичного страхування. Співробітникам надається можливість приєднати до програми страхування близьких родичів (чоловіка / дружину, дітей) зі знижкою 50 %.

Крім цього, усі співробітники мають доступ до опції вакцинації від грипу, що

допомагає зміцнити імунітет та запобігти захворюванням. У компанії регулярно проводяться тематичні тренінги з лікарями, профілактичні обстеження та консультації для того, щоб співробітники завжди мали змогу дбати про власне здоров'я та здоров'я своїх родин.

Управління ефективністю роботи співробітників

Визнання особистого внеску і розвитку наших працівників за допомогою управління ефективністю роботи. «Сингента» допомагає співробітнику розкривати свій потенціал і прагне визначити, визнати та відзначити ті досягнення персоналу, які склали основу успіху компанії. З цієї метою ми використовуємо, крім іншого, систему управління ефективністю роботи. Практику управління ефективністю роботи засновано на постійному, чесному і конструктивному діалозі між лінійним керівником та співробітниками. В основі цього діалогу лежать чітка постановка цілей і планування розвитку.

ВОЛОНТЕРСЬКІ АКТИВНОСТІ

Співпраця з фондом «Повернись живим»

Благодійний фонд «Повернись живим» отримав добровільну допомогу від компанії «Сингента», завдяки якій було передано необхідне оснащення для ГУР МО.



Співпраця з фондом «Благомай»

Разом із благодійним фондом «Благомай» підтримано проект «Нові лікарні» та передано обладнання для чотирьох лікарень у Сумській, Одеській і Дніпропетровській областях. Високотехнологічне обладнання для фізичної терапії тепер пришвидшує відновлення військових і цивільних пацієнтів. А системи фототерапії допомагають передчасно народженим дітям лікувати жовтяницю.



Об'єднуємо волонтерську спільноту

Волонтерство — серце нашої команди. Цього року було проведено **п'ять внутрішніх благодійних аукціонів, які зібрали 266 793 грн.** Кошти було спрямовано на підтримку колег та на фонд «Повернись живим». Благодійні аукціони не лише допомагають фінансово, а й створюють платформу для позитивних змін, демонструють силу колективної дії. Крім того, «Сингента» — **постійний партнер фонду «Життєлюб»**, разом із яким реалізує добровільні ініціативи. Уже кілька років працівники компанії беруть участь в акції «Обід без бід», під час якої волонтери роздають гарячі обіди та передають засоби гігієни і смаколики нашим Ба та Ді.

Протягом семи років компанія «Сингента» Україна разом із вихованцями **студії «Дімфо»** організовують благодійний «Ярмарок добра», а зібрані від нього кошти передають вихованцям студії та ГО «Творче об'єднання дітей і молоді з фізичними обмеженнями», щоб вони продовжували працювати з дітьми та молоддю з інвалідністю, а також на психологічну і реабілітаційну діяльність за допомогою арттерапії. Цього року до кола партнерів долучився ще один — **Центр соціальної адаптації й інтеграції для людей і молоді з особливими потребами ГО «WeCan»**. Дружня команда «Сингента» надала підтримку центру, де нині виховується десять дітей із різними формами ментальних порушень. Ми пишаємося тим, що компанія «Сингента» підтримує організації, які роблять усе можливе, щоб молодь з інвалідністю була готова до життя в суспільстві та мала всі шанси на працевлаштування й інтеграцію.

День донора

Уже вдруге компанія «Сингента» стала учасницею корпоративного Дня донора, який об'єднує колег заради важливої місії — порятунку життя.


Працівники компанії долучилися до донорства та здали кров для військових і цивільних пацієнтів. Зібрана кров допомогла більше як 100 пацієнтам, які потребували складних операцій.



Збереження української культурної спадщини

Цього року компанія «Сингента» стала партнером і меценатом мистецького проекту «Всесвіт Любові». Ця виставка присвячена творчості Любові Панченко — справжнього мистецького генія.

Виставка в Київському музеї — перший ретроспективний показ робіт Любові Панченко та вшанування пам'яті мисткині, яка залишила яскравий слід в історії українського мистецтва.



Контактна інформація

ЗАВІТАЙТЕ НА НАШ САЙТ, ДЕ ВИ ЗНАЙДЕТЕ БАГАТО АКТУАЛЬНОЇ
І КОРИСНОЇ ІНФОРМАЦІЇ: **WWW.SYNGENTA.UA**



ОФІЦІЙНИЙ ДОДАТОК
«СИНГЕНТА»



Зіскануйте QR-код
для переходу за посиланням

САЙТ WWW.SYNGENTA.UA,
РОЗДІЛ КОНТАКТИ



Зіскануйте QR-код для переходу за посиланням


КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР



0 800 50 04 49

Безкоштовно зі стаціонарних телефонів у межах України

Соціальні мережі




**ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ
СИНГЕНТА УКРАЇНА**

t.me/syngenta_ua




МИ У FACEBOOK

facebook.com/syngentaukraine




**НАШ КАНАЛ
YOUTUBE**

youtube.com/user/SyngentaUA



СИНГЕНТА УКРАЇНА В ТІКТОК

tiktok.com/@syngenta_ukraine



**СИНГЕНТА УКРАЇНА
В INSTAGRAM**

instagram.com/syngenta_ukraine



НАША ФОТОГАЛЕРЕЯ

flickr.com/photos/syngentaua



**МОБІЛЬНИЙ
ЗАСТОСУНОК
ДІМ. САД. ГОРОД**



Нотатки

Розкриймо потенціал рослини разом®

Розкриймо потенціал рослини разом®

syngenta.

03022, м. Київ,
вул. Козацька, 120/4, 3-й поверх

тел.: +380 (44) 494 17 71
факс: +380 (44) 494 17 70

Консультаційний центр

☎ 0 800 50 04 49

Безкоштовно зі стаціонарних телефонів в Україні

www.syngenta.ua

КАТАЛОГ ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ ТА КУКУРУДЗИ
розповсюджується безкоштовно

